

**Enquête
Démographique et
de Santé dans certaines
régions du Mali
EDSM V
2012-2013**

**Rapport
Préliminaire
(draft)**

**INFO-STAT
en collaboration avec
la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS),
Ministère de la Santé,
l'Institut National de la Statistique (INSTAT),
Ministère de l'Économie et des Finances, et
ICF International**

Ce rapport présente les résultats préliminaires de la cinquième Enquête Démographique et de Santé dans certaines régions du Mali (EDSM V). L'EDSM V 2012-2013 du Mali a été réalisée de Novembre 2012 à Février 2013 par INFO-STAT en collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS), du Ministère de la Santé, l'Institut National de la Statistique (INSTAT), Ministère de l'Économie et des Finances. L'EDSM V a également bénéficié de l'appui des services techniques du Ministère de la Santé Publique, les laboratoires de virologie et de parasitologie de l'Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP). L'EDSM V 2012-2013 a été financée par le Gouvernement du Mali et l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). En outre, ICF International a fourni l'assistance technique dans le cadre du programme mondial *MEASURE DHS* financé par l'USAID.

Pour tout renseignement concernant l'Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM V), contacter l'INFO-STAT,

BP 13416, Bamako, Mali

Téléphone : (223) 6673 7884,

Fax : (223) 2072 2174

Cellule de Planification et de Statistique (CPS/MS)

B.P. 232, Bamako, Mali

Téléphone : (223) 2023 2725

Fax : (223) 2023 2726

ou

Institut National de la Statistique (INSTAT/MEF)

B.P. 12, Bamako, Mali

Téléphone : (223) 2022 5285

Fax: (223) 2023 7145

Pour obtenir des informations sur le projet DHS, contactez ICF International, 11785 Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD 20705, USA ; Téléphone : 301-572-0200, Fax : 301-572-0999 ; Email : reports@measuredhs.com ; Internet : www.measuredhs.com.

RÉPUBLIQUE DU MALI

**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE
ET DE SANTÉ ET DANS CERTAINES
RÉGIONS DU MALI
(EDSM V) 2012-2013**

**Rapport préliminaire
(draft)**

Mai 2013

INFO-STAT

**Cellule de Planification et de Statistiques (CPS),
Institut National de la Statistique (INSTAT)
Bamako**

et

ICF International, Calverton, Maryland



TABLE DES MATIÈRES

1.	INTRODUCTION	1
2.	OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE	2
2.1	Objectifs de l'enquête.....	2
2.2	Questionnaires	3
2.3	Échantillonnage	4
2.4	Cartographie et collecte des données.....	5
2.5	Traitement des données	5
3.	RÉSULTATS : ENQUÊTE MÉNAGE ET ENQUÊTES INDIVIDUELLES.....	5
3.1	Couverture de l'échantillon.....	5
3.2	Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.....	6
3.3	Fécondité.....	8
3.4	Désir d'enfants (supplémentaires)	9
3.5	Utilisation de la contraception	10
3.6	Soins prénatals et accouchement	13
3.7	Vaccination des enfants	16
3.8	Prévalence et traitement des maladies de l'enfance.....	17
3.9	Allaitement et alimentation de complément	18
3.10	État nutritionnel des enfants.....	19
3.11	Tests de l'anémie et du paludisme	22
3.11.1	Couverture des tests de l'anémie et du paludisme auprès des enfants.....	22
3.11.2	Prévalence de l'anémie chez les femmes et les enfants	23
3.11.3	Prévalence du paludisme chez les enfants	23
3.12	Indicateurs du paludisme	26
3.13	Mortalité des enfants.....	28
3.14	Connaissance du VIH/sida.....	29
3.15	Multiplicité des partenaires sexuels et utilisation du condom	32

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Tableau 1. Résultat de l'interview ménage et de l'interview individuelle	6
Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés	7
Tableau 3. Fécondité actuelle	8
Tableau 4. Préférences en matière de fécondité.....	10
Tableau 5. Utilisation actuelle de la contraception	11
Tableau 6. Indicateurs de santé maternelle	14
Tableau 7. Vaccination des enfants.....	17
Tableau 8. Traitement des infections respiratoires aiguës, de la fièvre et de la diarrhée.....	18
Tableau 9. Allaitement selon l'âge de l'enfant.....	19
Tableau 10. État nutritionnel des enfants.....	22
Tableau 11. Couverture des tests de l'anémie et du paludisme	25
Tableau 12. Prévalence de l'anémie chez les enfants et les femmes	25
Tableau 13. Prévalence du paludisme chez les enfants.....	25
Tableau 14. Indicateurs du paludisme.....	28
Tableau 15. Mortalité des enfants	29
Tableau 16. Connaissance du sida	30
Tableau 17. Connaissance des moyens de prévention du VIH	31
Tableau 18.1 Partenaires sexuels multiples au cours des 12 derniers mois: Femmes.....	32
Tableau 18.2 Partenaires sexuelles multiples au cours des 12 derniers mois: Hommes.....	35
Graphique 1 : Taux de fécondité générale par âge selon le milieu de résidence	8
Graphique 2 : Taux de fécondité générale selon l'EDSM IV 2006 et l'EDSM V 2012-2013	9
Graphique 3 : Prévalence contraceptive (femmes en union), EDSM IV 2006 et EDSM V 2012-2013.....	12
Graphique 4 : Indicateurs de santé maternelle, EDSM IV 2006 et EDSM V 2012-2013	14
Graphique 5 : Prévalence des maladies des enfants de moins de 5 ans et recherche de traitement	18
Graphique 6 : Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans.....	20
Graphique 7 : Prévalence du paludisme chez les enfants de 6-59 mois	25
Graphique 8 : Tendances de la mortalité infantile et juvénile, EDSM IV 2006, RGPH 2009 et EDSM V 2012-2013.....	29

1. INTRODUCTION

La cinquième Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM V) a été réalisée par INFO-STAT en collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) du Ministère de la Santé et l'Institut National de la Statistique (INSTAT) du Ministère de l'Économie et des Finances. L'EDSM V a été réalisée en collaboration également des services techniques du laboratoire de virologie et de celui de parasitologie, de l'Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), Ministère de la Santé. L'EDSM V a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys - MEASURE DHS) d'ICF International, dont l'objectif est de collecter, analyser et diffuser des données démographiques et de santé portant en particulier sur la fécondité, la planification familiale, la santé et la nutrition de la mère et de l'enfant, et le VIH/sida.

L'EDSM V 2012-2013 a été financée par le Gouvernement du Mali et l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Sur le plan technique, l'EDSM V a bénéficié de l'assistance d'ICF International qui a la charge du programme des Enquêtes Démographiques et de Santé (*Demographic and Health Surveys – DHS*) au niveau international.

La cinquième Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM V) a été réalisée dans le but de disposer des données statistiques actualisées, désagrégées et de qualité au plan national sur la situation socio-démographique et sanitaire des populations nigériennes et en particulier des enfants et des femmes du Mali afin de rendre compte des progrès accomplis vis-à-vis des OMD, des objectifs du MDE et d'autres engagements mondiaux et nationaux en matière de développement social.

Toutefois, à la suite des événements survenus le 22 Mars 2012 sur le plan politique, l'aide au Mali dans le cadre de la collaboration bilatérale et internationale a été interrompue, entraînant l'arrêt complet des activités de la cinquième Enquête Démographique et de Santé (EDSM V) du Mali. La suite des événements a conduit à l'occupation progressive et généralisée des trois régions du Nord Gao, Tombouctou et Kidal, ainsi que trois cercles de la région de Mopti, à savoir Douentza, Youwarou et Tenenkou par des groupes armés rendant ainsi la circulation des personnes et des biens dans les trois régions et trois cercles de Mopti à de très gros risques d'insécurité.

Dans des efforts de soutien du Gouvernement Américain au Mali, le redémarrage des activités de l'EDSM V a été obtenu à titre exceptionnel dans les cinq régions du Sud Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako avec un financement de l'USAID mis à la disposition, et le démarrage des opérations de formation et de terrain à partir du mois de Septembre 2012.

L'environnement politique, économique et humanitaire actuel au Mali et la reprise des activités de l'EDSM V dans un cadre purement exceptionnel à la suite de la suspension intervenue après le bouleversement politique du 22 mars 2012, conduisaient à la mise en place de dispositions exceptionnelles et transitoires pouvant garantir l'exécution normale et complète de l'EDSM V dans le temps et dans les coûts, et afin de rendre disponibles les résultats au Gouvernement et ses partenaires au développement dans un délai relativement court. Ces dispositions exceptionnelles et transitoires concernaient l'exécution des activités de l'EDSM V et la gestion financière par un organisme privé.

Pour répondre à ce besoin, INFO-STAT, un organisme privé de recherche et de collecte d'informations statistiques au Mali a été retenu pour exécuter l'EDSM V en collaboration avec la CPS/santé et l'INSTAT. INFO-STAT a été retenu compte tenu de leur expérience en matière de collecte des données statistiques et de collaboration avec le Gouvernement dans le cadre de l'Enquête nationale sur l'Anémie et la Parasitémie palustre du Mali 2010 (Mali A&P 2010).

La Cellule de Planification et de Statistique (CPS) du Ministère de la Santé et l'Institut national de la Statistique (INSTAT) représenteront le Gouvernement du Mali et assuraient la Direction Nationale de l'EDSM V. INFO-STAT assurait la Direction Technique.

Ce rapport préliminaire, répond au souci de présenter de façon succincte les premiers résultats de l'EDSM V. Il fournit des indicateurs de base relatifs à la fécondité, à la planification familiale, à la santé de

la reproduction, à la santé et état nutritionnel des enfants, et à la connaissance et aux comportements par rapport au VIH/Sida dans les cinq régions du Mali non encore occupées au moment de la collecte. L'EDSM V fournit également une estimation de la prévalence de l'anémie et du paludisme chez les enfants.

Du fait qu'ils ont été produits avant la révision finale et l'analyse approfondie du fichier complet de l'enquête, ces résultats restent provisoires et susceptibles de légères modifications.

Un rapport final, présentant tous les résultats définitifs de l'enquête, de façon détaillée, sera publié dans les prochains mois.

Enfin, pour la première fois au Mali, des tablettes ont été utilisées par les enquêtrices et enquêteurs pour conduire les interviews et collecter les informations auprès des enquêtés sur le terrain. Après avoir compléter chaque grappe sur le terrain, le chef de l'équipe était en charge de se connecter à un réseau de transmission et transférer les données collectées à l'ordinateur central situé au bureau central à Bamako. Ainsi, le suivi de la collecte se faisait en temps réel au jour le jour, et au fur et à mesure que la collecte progressait.

2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

2.1 Objectifs de l'enquête

La cinquième Enquête Démographique et de Santé du Mali a pour objectif principal de produire de nombreux indicateurs socio-économiques, démographiques, sanitaires et nutritionnels au niveau de l'ensemble de la population et des sous-populations des femmes de 15-49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15-59 ans. En particulier, l'EDSM V vise à identifier et/ou à estimer :

Pour l'ensemble de la population :

- les niveaux de scolarisation ;
- les niveaux d'utilisation du sel iodé ;
- certains indicateurs de bien-être des ménages.

Pour les femmes de 15-49 ans et les enfants de moins de cinq ans :

- divers indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité, de mortalité des enfants et de mortalité maternelle ;
- les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la fécondité, tels que les comportements matrimoniaux, les comportements sexuels et l'utilisation de la contraception ;
- les catégories de femmes susceptibles d'avoir plus ou moins d'enfants et susceptibles d'utiliser la contraception ;
- les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon diverses caractéristiques sociodémographiques ;
- les problèmes liés à la pratique des avortements clandestins ;
- les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la mortalité des enfants ;
- les différentes composantes de la santé de la reproduction et de la santé des enfants : visites prénatales et postnatales, conditions d'accouchement, allaitement, vaccinations, prévalence et traitement de la diarrhée, de la fièvre et des Infections Respiratoires Aigües (IRA) chez les enfants de moins de cinq ans ;
- l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen des mesures anthropométriques (poids et taille) ;
- la prévalence de l'anémie chez les enfants de moins de cinq ans au moyen d'un test sanguin ;
- le niveau de connaissance, les opinions et attitudes ainsi que les comportements à risque des femmes vis-à-vis des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/sida.
- la prévalence de l'anémie et du VIH chez les femmes de 15-49 ans.

- la prévalence de l'anémie et de la parasitémie palustre chez les enfants 6-59 mois.

Pour les hommes de 15-59 ans :

- les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la fécondité, tels que les comportements matrimoniaux, les comportements sexuels et l'utilisation de la contraception ;
- les catégories d'hommes susceptibles d'avoir plus ou moins d'enfants et susceptibles d'utiliser la contraception ;
- le niveau de connaissance, les opinions et attitudes ainsi que les comportements à risque des hommes vis-à-vis des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/sida.
- la prévalence de l'anémie et du VIH chez les hommes de 15-59 ans.

L'ensemble des données collectées constitue une base de données qui facilitera la mise en place et le suivi de politiques et de programmes dans le domaine de la population et de la santé et, plus globalement, de politiques visant à l'amélioration des conditions de vie de la population Nigérienne. Par ailleurs, les données ayant été collectées selon une méthodologie similaire à celle utilisée dans de nombreux autres pays ayant participé au programme DHS, elles font partie, de ce fait, d'une base de données utilisables et comparables au niveau international.

2.2 Questionnaires

Afin d'atteindre les objectifs fixés, trois types de questionnaires ont été utilisés. Les questionnaires ont été programmés sur des tablettes PC que les agents de collecte utilisaient pour poser les questions et enregistrer directement les résultats de l'interviews. Les trois types de questionnaires utilisés étaient :

1) **Questionnaire ménage.** Il permet de collecter des informations sur le ménage notamment les caractéristiques du ménage, des membres du ménage et du logement. Il comprend les différentes parties suivantes :

- Tableau ménage qui permet de collecter, entre autres informations, l'âge, le sexe, le niveau d'instruction des membres du ménage ;
- Caractéristiques du logement (type de toilettes, eau, mur du logement, etc.) ;
- Moustiquaires ;
- Travail et discipline des enfants ;
- Test de sel pour la teneur en iode ;
- Poids, taille et test d'hémoglobine des enfants de moins de 5 ans ;
- Poids, taille, test d'hémoglobine et test de VIH des femmes.
- Test de VIH des hommes.

En outre, le questionnaire ménage permet d'établir l'éligibilité des personnes à interviewer individuellement. Il permet aussi de déterminer les populations de référence pour le calcul de certains taux démographiques.

2) **Questionnaire femme.** Il comprend les douze sections suivantes :

1. Caractéristiques sociodémographiques de l'enquêtée ;
2. Reproduction ;
3. Contraception ;
4. Grossesse et soins postnatals ;
5. Vaccination des enfants, santé et nutrition;
6. Mariage et activité sexuelle;
7. Préférences en matière de fécondité ;
8. Caractéristiques du conjoint et travail de la femme ;
9. VIH/sida ;
10. Excision ;
11. Fistule ;
12. Autres problèmes de santé ;

13. Violence domestique ;
 14. Mortalité maternelle ;
- 3) Questionnaire **homme**. Il s'agit également d'un questionnaire individuel comprenant les huit sections suivantes :
1. Caractéristiques sociodémographiques de enquêté ;
 2. Reproduction ;
 3. Contraception ;
 4. Mariage et activité sexuelle ;
 5. Préférences en matière de fécondité ;
 6. Emploi et rôle des sexes
 7. VIH/sida ;
 8. Autres problèmes de santé ;
 9. Excision.

Ces instruments ont été développés à partir des questionnaires de base du programme DHS, préalablement adaptés au contexte du Mali et en tenant compte des objectifs de l'enquête.

Par ailleurs, plusieurs séances de traduction des principales expressions et termes, et surtout relatifs aux aspects sensibles des questionnaires (en particulier, les questions sur la reproduction, l'activité sexuelle, la contraception et les maladies) ont été traduits dans les principales langues parlées au Mali (Bambara/Malinké, Sonhai, Peulh) de façon à ce qu'au cours de l'enquête, les enquêtrices traduisent les questions le plus fidèlement possible.

2.3 Échantillonnage

L'échantillon de l'EDSM V 2012-2013 est un échantillon représentatif au niveau ensemble des cinq régions, basé sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés. L'échantillon de l'EDSM V est un échantillon représentatif de ménages. Contrairement aux EDS passées qui avaient onze domaines d'études, l'EDSM V comprenait 8 domaines d'études constitués de chacune des cinq régions du pays et le district de Bamako non occupées par des groupes armés (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako), du milieu urbain et du milieu rural.

Initialement, 585 grappes ont été sélectionnées au premier degré, et tirées proportionnellement à leur taille, à partir de la liste des Zones de Dénombrement (ZD) établie lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) de 2009. Cependant à cause de l'occupation des trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) par des groupes armés rendant impossible les opérations de collecte dans ces régions et dans trois cercles de la région de Mopti, à savoir Douentza, Youwarou et Tenenkou, finalement 435 grappes représentant les cinq régions du Sud (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) et le district de Bamako, étaient disponibles pour conduire la collecte de l'EDSM V. Il est à noter que la taille pour la zone du Nord, en particulier Kidal a été sur-échantillonnée de (ratio 1:8) afin qu'ils pussent constituer des domaines d'études. Finalement, la portion non réellement enquêtée des ménages des 585 grappes représentaient moins de 10% de l'échantillon national tirée.

Ainsi, toutes les 435 grappes sélectionnées, ont fait l'objet d'un dénombrement exhaustif des ménages. Cependant, trois grappes n'ont pas pu être dénombré pour les mêmes raisons d'insécurité citées ci-dessus, sans que cela affecte pas les résultats de la région. Dans les grappes dénombrées, des ménages ont été tirés au deuxième degré, à probabilité égale, à partir de la liste des ménages établie lors de l'opération de dénombrement. Le nombre de ménages tirés est de 26 dans chaque grappe urbaine ou rurale. Au total, 11 310 ménages ont été sélectionnés pour conduire l'enquête ménage dans les cinq régions et le district de Bamako.

Tous les membres des ménages tirés ont été identifiés à l'aide du questionnaire ménage. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (résidentes habituelles ou visiteuses) qui se trouvaient dans ces ménages ont été enquêtées individuellement. En outre, ces femmes, de même que tous les enfants âgés de moins de cinq ans, ont été mesurés et pesés et, dans un ménage sur deux ; en outre, ils ont fourni un échantillon de sang

pour estimer la prévalence de l'anémie et du VIH chez les femmes, et la prévalence de l'anémie et de la parasitémie palustre chez les enfants.

De plus, dans le sous-échantillon des ménages ayant servi au test de sang chez les femmes et les enfants, tous les hommes de 15 à 59 ans (résidents habituels ou visiteurs) ont également été enquêtés individuellement et testés pour le VIH.

2.4 Cartographie et collecte des données

L'opération de cartographie et de dénombrement des 435 grappes de l'échantillon s'est déroulée sur le terrain du 25 janvier au 27 mars 2012, soit en deux mois et au milieu du bouleversement politique survenu le 22 mars 2012. Douze équipes composées de 2 agents cartographes et énumérateurs, préalablement formés, étaient chargés de ce travail. Le travail de cartographie a été effectué sur le terrain à l'aide de tablettes.

Un pré-test des questionnaires, combinée à l'enquête principale, a été effectué du 6 au 9 novembre 2012 : cent vingt-trois agents ont été recrutés, formés et répartis en vingt équipes, puis déployés en zone urbaine (Bamako) et en zone rurale non loin de Bamako. Les enseignements tirés de ce pré-test ont permis de finaliser les questionnaires et les programmes sur les tablettes.

La formation pour l'enquête principale s'est déroulée du 26 septembre au 31 octobre 2012. Cent vingt-trois personnes ayant, au moins, un niveau de fin d'études secondaires ont suivi la formation. À l'issue de la formation, les meilleurs candidats ont été retenus pour la collecte et répartis en vingt équipes, composées chacune d'un chef d'équipe, d'un enquêteur homme et de trois agents enquêtrices. Soixante parmi les meilleurs agents ont été formés à effectuer les mesures anthropométriques et prélever les gouttes de sang pour les tests d'anémie, de la parasitémie palustre et du VIH.

La collecte des données sur l'ensemble du territoire national a débuté le 13 novembre 2012 et s'est achevée le 31 janvier 2013.

2.5 Traitement des données

Au cours de l'EDSM V, les interviews ont été conduites à l'aide des tablettes PC, et les informations directement saisies au cours de l'interview. Les questionnaires ont été téléchargés en utilisant le logiciel CSPro, développé conjointement par le Bureau du Recensement des Etats-Unis et le Programme DHS. Trois personnes au bureau central étaient chargées de la réception et de la vérification des données saisies sur le terrain et envoyées à l'ordinateur central à l'INSAE en utilisant le réseau internet.

À la fin de la collecte sur le terrain, les données saisies sur les tablettes ont été éditées en vue de vérifier la cohérence interne des réponses. La vérification finale a été réalisée par un informaticien et un démographe du programme DHS, utilisant une technique éprouvée au cours de dizaines d'enquêtes antérieures similaires.

3. RÉSULTATS : ENQUÊTE MÉNAGE ET ENQUÊTES INDIVIDUELLES

3.1 Couverture de l'échantillon

Au cours de EDSM V, un échantillon de 435 grappes a été tiré finalement pour les cinq régions du Sud et le district de Bamako. Au total, 10 743 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 10 265 ménages occupés ont été identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 10 265 ménages occupés, 10 105 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de 98 % (Tableau 1). Les taux de réponses sont quasiment identiques en milieu rural, urbain et à Bamako.

Tableau 1. Résultat de l'interview ménage et de l'interview individuelle

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse selon le milieu de résidence (non pondéré), Mali 2012-2013

Résultat	Milieu de résidence				Ensemble
	Bamako	Autres villes	Ensemble urbain	Rural	
Interview des ménages					
Ménages sélectionnés	1 742	271	3 013	7 730	10 743
Ménages occupés	1 637	201	2 838	7 427	10 265
Ménages interviewés	1 579	185	2 764	7 341	10 105
Taux de réponse des ménages ¹	96,5	98,7	97,4	98,8	98,4
Interview des femmes de 15-49 ans					
Effectif de femmes éligibles	2 105	330	3 435	7 440	10 875
Effectif de femmes éligibles interviewées	1 970	292	3 262	7 162	10 424
Taux de réponse des femmes éligibles ²	93,6	97,1	95,0	96,3	95,9
Interview des hommes de 15-59 ans					
Effectif d'hommes éligibles	976	554	1 530	3 190	4 720
Effectif d'hommes éligibles interviewés	811	521	1 332	3 067	4 399
Taux de réponse des hommes éligibles ²	83,1	94,0	87,1	96,1	93,2
Interview des hommes de 15-49 ans					
Effectif d'hommes éligibles	882	494	1 376	2 732	4 108
Effectif d'hommes éligibles interviewés	730	463	1 193	2 623	3 816
Taux de réponse des hommes éligibles ²	82,8	93,7	86,7	96,0	92,9

¹ Ménages interviewés/Ménages occupés
² Enquêtes interviewés/Enquêtes éligibles

Dans les 10 105 ménages enquêtés, 10 875 femmes âgées de 15-49 ans ont été identifiées comme étant éligibles pour l'enquête individuelle et, pour 10 424 d'entre elles, l'interview a été menée avec succès, soit un taux de réponse de 96 %. L'enquête homme a été réalisée dans un ménage sur deux : 4 720 hommes étaient éligibles et 4 399 ont été interviewés (taux de réponses de 93 %). Les taux de réponse enregistrés en milieu urbain sont un peu plus faibles que ceux obtenus en milieu rural, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. En particulier chez les hommes, le taux de réponse est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (96 % contre 83 %).

3.2 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Les femmes âgées de 15-49 ans, c'est-à-dire celles en âge de procréer, et les hommes de 15-59 ans constituent les populations-cibles de l'EDSM V. Le tableau 2 présente la répartition des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, à savoir l'âge, la religion, l'ethnie, l'état matrimonial, le milieu de résidence, la région et le niveau d'instruction. Pour chaque catégorie, le tableau présente l'effectif non pondéré, c'est-à-dire le nombre de femmes ou d'hommes effectivement enquêtés dans chaque catégorie, ainsi que l'effectif pondéré correspondant, c'est-à-dire le nombre de femmes ou d'hommes auquel on a redonné son poids réel dans la population totale du Mali. Bien que l'enquête ait porté sur les hommes de 15-59 ans, dans ce tableau et tous les tableaux suivants, les résultats détaillés par caractéristiques sociodémographiques sont limités aux hommes de 15-49 ans de façon à pouvoir les comparer directement aux femmes de ce même groupe d'âges.

La répartition par âge met en évidence une forte proportion de jeunes. En effet, 18 % de femmes et 21 % d'hommes sont âgés de 15-19 ans ; environ 20 % de femmes et 14 % d'hommes appartiennent au groupe d'âges 25-29 ans. Puis, au fur et à mesure que l'âge augmente à partir du groupe d'âges 25-29 ans, on constate une diminution régulière des proportions. Globalement, ces caractéristiques reflètent la structure d'une population jeune.

En ce qui concerne l'état matrimonial, on relève que 85 % de femmes et 63 % d'hommes étaient en union au moment de l'enquête. Du fait que les hommes ont tendance à se marier plus tard que les femmes, la proportion de célibataires est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (37 % contre 14 %). À l'inverse, la proportion de personnes en rupture d'union (divorce, séparation ou veuvage) est nettement plus élevée chez les femmes (2 %) que chez les hommes (1 %).

La répartition selon le milieu de résidence montre que 25 % de femmes et 26 % d'hommes résident en milieu urbain. La répartition géographique de la population reflète bien le poids démographique respectif de chaque région. Ainsi, le tableau 2 révèle que les régions de Sikasso (23 % de femmes et d'hommes), de Koulikoro (21 % de femmes et 19 % d'hommes) et Ségou (18 % de femmes et 20 % d'hommes) regroupe le plus de femmes et d'hommes de la population Malienne, suivi du district de Bamako (13 % de femmes et 14 % d'hommes).

On constate que globalement, les hommes sont plus instruits que les femmes. En effet, 13 % d'hommes contre 6 % de femmes ont atteint un niveau d'instruction secondaire ou plus ; à l'opposé, proportionnellement plus de femmes que d'hommes sont sans instruction (76 % contre 61 %).

Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Groupe d'âges						
15-19	18,1	1 891	1 918	20,9	792	752
20-24	17,7	1 845	1 880	12,8	486	483
25-29	19,9	2 078	2 075	13,8	524	534
30-34	16,0	1 669	1 657	14,3	545	550
35-39	12,8	1 335	1 330	14,7	560	573
40-44	8,8	914	902	12,4	471	497
45-49	6,6	693	662	11,0	418	427
État matrimonial						
Célibataire	13,6	1 417	1 481	36,6	1 391	1 374
Marié(e)	83,0	8 651	8 558	60,9	2 312	2 352
Vivant ensemble	1,6	168	179	1,7	63	59
Divorcé(e)/séparé(e)/ Veuve/veuf	1,8	187	206	0,8	30	31
Milieu de résidence						
Urbain	24,8	2 583	3 262	25,7	977	1 193
Rural	75,2	7 841	7 162	74,3	2 819	2 623
Région						
Kayes	12,8	1 333	1 636	12,1	459	587
Koulikoro	21,1	2 196	1 805	18,9	716	622
Sikasso	22,6	2 359	1 729	23,4	888	635
Ségou	18,2	1 900	1 796	20,1	763	707
Mopti	11,9	1 241	1 488	11,2	424	535
Bamako	13,4	1 394	1 970	14,4	545	730
Niveau d'instruction						
Aucun	75,8	7 903	7 721	60,7	2 302	2 287
Primaire	17,9	1 863	1 960	26,0	986	988
Secondaire ou +	6,3	657	743	13,4	508	541
Ensemble 15-49 ¹	100,0	10 424	10 424	100,0	3 796	3 816
50-64	na	na	na	na	603	583
Ensemble 15-64	na	na	na	na	4 399	4 399

Note: Les niveaux d'instruction correspondent au plus haut niveau atteint, qu'il soit achevé ou non.
na = Non applicable

3.3 Fécondité

L'estimation du niveau de la fécondité est obtenue directement à partir des informations fournies par les femmes sur l'historique de leurs naissances. Les indicateurs sont calculés sur la période de trois ans précédant l'enquête. Cette période de trois années a été retenue comme compromis entre trois exigences : fournir les niveaux de fécondité les plus récents possibles, réduire les erreurs de sondage et réduire les effets des transferts possibles d'année de naissance des enfants déclarée par la mère. La fécondité est mesurée par les taux de fécondité par groupe d'âges quinquennaux et par leur cumul, c'est-à-dire l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF). L'ISF mesure le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'aurait une femme, en fin de période féconde, dans les conditions de fécondité actuelle.

Le tableau 3 indique qu'en moyenne, l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est estimé à 6,1 enfants par femme ; l'ISF est plus élevé en milieu rural (en moyenne, 6,5 enfants par femme) qu'en milieu urbain (5,0 enfants). On observe également qu'à tous les âges, les taux de fécondité sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain (Graphique 1). Les courbes de fécondité urbaine et rurale suivent une tendance similaire, c'est-à-dire, qu'elles augmentent rapidement pour atteindre un maximum à 25-29 ans avant de baisser de façon régulière avec l'âge. En milieu urbain, c'est dans le groupe d'âges 25-29 ans que le niveau de fécondité maximum est atteint (233 ‰) alors qu'en milieu rural la fécondité est beaucoup plus précoce puisque même si le taux maximal est atteint à 25-29 ans (283 ‰), un niveau similaire élevé est également atteint dès 20-24 ans (273 ‰), pour commencer à diminuer et atteindre 87 ‰ à 40-44 ans. De plus, si les adolescentes de 15-19 ans contribuent pour 12 % à la fécondité totale du milieu urbain, elles contribuent pour 15 % à la fécondité du milieu rural.


Tableau 3. Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années précédant l'enquête, par milieu de résidence, Mali 2012-2013


Groupe d'âges	Milieu de résidence			EDSM IV 2006
	Urbain	Rural	Ensemble	
15-19	122	192	172	188
20-24	191	273	252	283
25-29	233	283	272	292
30-34	213	236	231	255
35-39	152	171	166	180
40-44	69	87	84	91
45-49	24	49	44	25
ISF (15-49)	5,0	6,5	6,1	6,6
TGFG	173	225	212	229
TBN	36,7	39,2	38,8	45,2

Note: Les taux sont exprimés pour 1000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés du fait de données incomplètes. Les taux correspondent à la période 1-36 mois avant l'enquête.

ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme
 TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes de 15-44 ans
 TBN : Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus



En 2006, l'ISF avait été estimé à 6,6 enfants par femme (5,4 en urbain et 7,2 en rural), contre 6,1 en 2012-2013 (5,0 en urbain et 6,5 en rural). Il semblerait donc qu'il y ait eu une baisse du niveau de fécondité entre les deux enquêtes, même si l'EDSM V ne porte que sur les cinq régions du Sud. La comparaison des taux par âge de 2006 et 2012-2013 (Graphique 2) met en évidence des courbes régulières et très proches avec le maximum de fécondité toujours atteint à 25-29 ans.



3.4 Désir d'enfants (supplémentaires)

Parmi les femmes actuellement en union, 21 % ont déclaré ne plus vouloir d'enfants (supplémentaires), proportion relativement peu élevée. À l'opposé, 69 % des femmes ont déclaré qu'elles souhaitaient un enfant ou un autre enfant : 34 % ont déclaré qu'elles souhaitaient un enfant ou un autre enfant dans les deux années à venir, et 28 % souhaiteraient cet enfant plus tard (après deux ans) c'est-à-dire qu'elles expriment le désir d'un certain espacement des naissances (Tableau 4). Par ailleurs, 7 % des femmes voudraient un enfant ou un enfant supplémentaire mais elles ne savent pas quand. Par rapport aux données de l'EDSM IV 2006, on constate que la proportion de femmes qui ne veulent plus d'enfant n'a pas beaucoup changé (20 % en 2006 contre 21 % en 2012-2013) ; en outre, la proportion de femmes qui souhaitent espacer leur prochaine naissance a légèrement baissé (34 % en 2006 et 28 % en 2012-2013). De même, la proportion de femmes qui désirent avoir un prochain enfant dans les deux années à venir (29 % en 2006 et 34 % en 2012-2013) et celle des indévisées (2 % en 2006 et 6 % en 2012-2013) a augmenté depuis l'enquête précédente.

La proportion de femmes qui veulent limiter leur descendance augmente de façon importante avec le nombre d'enfants vivants : de moins de 1 % chez les femmes n'ayant pas d'enfant, la proportion passe à 4 % chez les femmes ayant un seul enfant vivant, puis 7 % chez celles ayant deux enfants vivants, 12 % chez celles ayant trois enfants vivants, et atteint un maximum de 55 % chez les femmes ayant six enfants ou plus. La proportion de femmes qui veulent espacer leurs naissances (attendre deux ans ou plus avant le prochain enfant) est relativement élevée quel que soit le nombre d'enfants vivants, sauf chez les femmes sans enfant (3 %).

Tableau 4. Préférences en matière de fécondité

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par désir d'enfants (supplémentaires), selon le nombre d'enfants vivants, Mali 2012-2013

Désir d'enfant(s)	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Veut un autre bientôt ²	71,7	48,0	43,8	35,9	29,1	22,8	11,6	34,0
Veut un autre plus tard ³	2,5	34,3	36,1	35,0	32,9	23,9	15,1	27,8
Veut un autre, NSP quand	16,4	8,2	7,5	8,9	6,3	6,0	2,4	7,0
Indécise	1,7	2,6	2,1	5,7	6,9	7,2	10,5	5,6
Ne veut plus d'enfant	0,5	4,1	7,2	11,6	21,6	34,0	54,5	21,3
Stérilisée	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
S'est déclarée stérile	7,1	2,7	3,3	2,9	3,0	6,0	5,7	4,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	526	1 287	1 460	1 465	1 374	1 103	1 605	8 820

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle

² Veut une autre naissance dans les deux ans

³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus

3.5 Utilisation de la contraception

L'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes de 15-49 ans en union n'est pas très élevée : 10,3 % ont déclaré utiliser une méthode contraceptive quelconque au moment de l'enquête (Tableau 5), et la plupart utilise une méthode moderne (9,9 % contre 0,5 % pour les méthodes traditionnelles). **La tendance est à la hausse depuis l'EDSM IV 2006, passant de 6,9 % en 2006 à 9,9 % à la présente enquête.** En effet, entre les deux enquêtes, la prévalence contraceptive moderne, y compris la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) est quant à elle passé de 6,9 % en 2006 à 9,9 % en 2012-2013 (Graphique 3). Cependant, sans la MAMA, la prévalence contraceptive moderne est passé de 6,4 % en 2006 à 9,9 % en 2012-2013. La prévalence contraceptive traditionnelle est pratiquement restée la même (1,4 % en 2006 contre 0,5 % en 2012-2013). L'augmentation de la prévalence contraceptive moderne provient essentiellement de celle des injectables (passant de 2,5 % à 4,0 %), les implants (0,1 % en 2006 contre 2,5 % en 2012-2013). La pilule (2,7 %), les injectables (4,0 %) et les implants (2,5 %) sont les méthodes contraceptives moderne les plus utilisées.

En outre, les résultats mettent en évidence des écarts importants d'utilisation de la contraception. Du point de vue du milieu de résidence, c'est en milieu urbain que l'utilisation de la contraception est la plus fréquente : 22 % des femmes en union utilisent actuellement une méthode moderne en milieu urbain contre 7 % en milieu rural. En milieu urbain, 7 % de femmes utilisent la pilule, 7 % utilisent les injectables et 6 % utilisent les implants. Sur le plan régional, c'est à Bamako que la prévalence contraceptive moderne est la plus élevée (23 %) tandis qu'à Mopti, seulement 3 % de femmes en union utilisent une méthode moderne.

Le niveau d'instruction des femmes constitue un autre facteur différentiel important. Chez les femmes ayant au moins un niveau d'instruction secondaire ou plus, 31 % utilisent actuellement une méthode moderne, contre 17 % chez celles ayant un niveau primaire et 8 % chez celles n'ayant aucun niveau d'instruction.

Par ailleurs, on relève que la prévalence de la contraception moderne varie selon le groupe d'âges de la femme, des minimums de 7 % à 15-19 ans et de 6 % à 45-49 ans, à un maximum de 12 % à 30-39 ans. Les plus fortes proportions d'utilisatrices se situent donc à 30-39 ans. Chez les femmes de 45 ans ou plus, les taux (6 %) sont légèrement plus faibles qu'aux jeunes âges.

On note également que le niveau d'utilisation de la contraception moderne varie en fonction du nombre d'enfants vivants de la femme. Les femmes ayant 3 à 5 enfant(s) ou plus sont celles qui utilisent le plus fréquemment la contraception moderne (11 %), essentiellement les injectables (5 %), la pilule (3 %) et les implants (3 %).


Tableau 5. Utilisation actuelle de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Niger 2012

Caractéristique sociodémographique	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	DIU	Pilule	Méthode moderne					Méthode traditionnelle			N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes	
						Injectable	Implant	Condom masculin	MAMA ¹	Autre	Une méthode traditionnelle	Collier	Autre ²				
Groupe d'âges																	
15-19	6,7	6,5	0,0	0,0	1,3	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	93,3	100,0	813	
20-24	10,3	10,0	0,0	0,4	3,0	3,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	89,7	100,0	1 560	
25-29	10,0	9,5	0,0	0,3	3,5	3,4	2,1	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,4	90,0	100,0	1 981	
30-34	12,2	11,8	0,1	0,6	2,6	5,1	3,1	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	87,8	100,0	1 627	
35-39	12,4	11,9	0,5	0,5	3,0	4,4	3,3	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,4	87,6	100,0	1 302	
40-44	11,4	10,5	0,1	0,3	2,9	4,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,6	88,6	100,0	880	
45-49	6,0	5,5	0,1	0,0	1,4	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	94,0	100,0	655	
Milieu de résidence																	
Urbain	22,8	21,8	0,3	1,2	7,2	6,5	5,9	0,5	0,0	0,1	1,0	0,1	0,8	77,2	100,0	1 824	
Rural	7,1	6,8	0,0	0,1	1,6	3,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	92,9	100,0	6 995	
Région																	
Kayes	7,1	6,4	0,1	0,3	1,0	2,9	2,1	0,0	0,0	0,1	0,7	0,2	0,4	92,9	100,0	1 180	
Koulikoro	9,7	9,3	0,1	0,1	1,9	4,2	2,7	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	90,3	100,0	1 901	
Sikasso	11,1	10,8	0,1	0,3	2,9	5,4	1,8	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	88,9	100,0	2 071	
Ségou	9,8	9,5	0,0	0,1	3,3	3,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	90,2	100,0	1 646	
Mopti	3,1	2,7	0,0	0,1	1,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	96,9	100,0	1 081	
Bamako	23,5	22,5	0,4	1,8	7,2	6,4	6,1	0,3	0,1	0,0	1,1	0,2	0,8	76,5	100,0	941	
Niveau d'instruction																	
Aucun	8,1	7,8	0,1	0,2	2,1	3,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	91,9	100,0	7 255	
Primaire	17,1	16,8	0,1	0,7	5,1	6,2	4,5	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	82,9	100,0	1 233	
Secondaire ou +	33,3	30,9	0,5	2,9	9,0	9,1	7,5	2,0	0,0	0,0	2,4	1,2	1,0	66,7	100,0	332	
Nombre d'enfants vivants																	
0	5,2	4,7	0,0	0,1	0,9	1,8	1,1	0,9	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	94,8	100,0	699	
1-2	9,0	8,7	0,1	0,4	3,3	3,1	1,6	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	91,0	100,0	2 787	
3-4	11,7	11,2	0,1	0,4	2,8	4,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	88,3	100,0	2 786	
5+	11,7	11,2	0,2	0,4	2,6	5,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	88,3	100,0	2 547	
Ensemble ³	10,3	9,9	0,1	0,4	2,7	4,0	2,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4	89,7	100,0	8 820	

Note: Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

¹MAMA : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée.² Y compris le retrait et la continence périodique de presque 0,0%.³ Y compris 11 cas de femmes en union, pour lesquels le niveau d'instruction est manquant.



3.6 Soins prénatals et accouchement

Les soins prénatals appropriés durant la grossesse et pendant l'accouchement sont importants pour assurer à la mère et à son enfant une bonne santé.

Au cours de l'EDSM V, un certain nombre de questions sur les soins prénatals et sur la santé de l'enfant ont été posées à toutes les mères ayant eu une naissance au cours des cinq années précédant l'enquête.

Pour chaque enfant dernier-né dont la naissance a eu lieu au cours des cinq années précédant l'enquête, on a demandé aux mères si elles s'étaient rendues en consultation prénatale, qui elles avaient consulté, si elles avaient été vaccinées contre le tétanos. En outre, pour toutes leurs naissances survenues au cours des cinq dernières années, on a aussi demandé aux mères d'indiquer où elles avaient accouché et quelles personnes les avaient assistées pendant l'accouchement.

Dans l'ensemble, 74 % de femmes ont consulté un professionnel de santé durant la grossesse de leur naissance la plus récente (Tableau 6) et cette proportion a légèrement augmenté depuis l'EDSM IV de 2006 (70 %) (Graphique 4). Le recours aux consultations prénatales varie peu par rapport à l'âge de la femme. Cependant, on observe un écart important entre les milieux de résidence : en effet, les femmes vivant en milieu urbain (93 %) ont plus fréquemment consulté un professionnel de santé que celles résidant en milieu rural (69 %).

Des disparités non négligeables de cette proportion sont aussi observées selon les régions. La région de Mopti (60 %) se distingue par le taux de consultation prénatale le plus faible.

Tableau 6. Indicateurs de santé maternelle

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire formé pour la dernière naissance vivante et pourcentage de femmes dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal ; parmi toutes les naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage de celles dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé et pourcentage de celles qui ont eu lieu dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire formé ¹	Pourcentage de femmes dont la naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal ²	Effectif de femmes	Pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé ³	Pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé	Effectif de naissances
Age de la mère à la naissance						
<20	75,3	45,0	1 169	61,4	59,0	1 912
20-34	74,2	48,0	4 583	58,3	54,5	7 170
35+	73,3	47,2	1 021	56,2	52,2	1 320
Milieu de résidence						
Urbain	93,2	63,2	1 399	92,4	91,4	1 983
Rural	69,3	43,2	5 374	50,7	46,4	8 419
Région						
Kayes	69,2	47,4	884	49,7	46,9	1 365
Koulikoro	74,3	49,4	1 425	64,6	62,5	2 175
Sikasso	78,5	46,0	1 615	66,0	62,5	2 486
Ségou	70,0	45,4	1 268	48,8	41,3	1 989
Mopti	60,1	35,2	849	29,8	26,2	1 338
Bamako	94,5	63,7	732	95,9	95,1	1 049
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	70,7	44,0	5 555	53,9	49,9	8 688
Primaire	88,5	60,5	974	79,1	77,2	1 399
Secondaire ou +	98,4	70,6	244	98,1	97,9	315
Ensemble ⁴	74,2	47,3	6 773	58,6	55,0	10 402

¹ Les médecins, les infirmières, sages-femmes et matrones sont considérés ici comme des prestataires formés pour les soins prénatals.


² Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de leur dernière naissance ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des dix années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, 5 injections à n'importe quel moment avant la dernière naissance vivante

³ Les médecins, les infirmières, sages-femmes et matrones sont considérés comme des prestataires formés pour l'assistance à l'accouchement.

Le district de Bamako (95 %), ainsi que les régions de Sikasso (79 %) et Koulikoro (74 %) sont celles dont les proportions de femmes ayant consulté un professionnel de santé durant la grossesse sont les plus élevées. La consultation prénatale par un agent formé est fortement influencée par le niveau d'instruction de la mère. Les femmes sans niveau d'instruction (71 %) sont proportionnellement moins nombreuses que les autres à avoir bénéficié de soins prénatals au cours de la grossesse de leur dernier-né. Par contre, cette proportion passe à 98 % chez les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus.

Les injections à l'anatoxine antitétanique (VAT) sont faites aux femmes enceintes pour prévenir le tétanos néonatal, une des causes les plus importantes de mortalité néonatale. Pour assurer la protection du nouveau-né, la mère doit recevoir au minimum deux injections antitétaniques pendant la grossesse ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance vivante) ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des cinq années ayant précédé la dernière naissance vivante) ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des dix années ayant précédé la dernière naissance vivante) ou encore, au moins, cinq injections à n'importe quel moment avant la dernière naissance vivante.

Graphique 4 Indicateurs de santé maternelle et infantile, EDSM IV 2006 et EDSM V 2012-2013*



* Sans les 3 régions du Nord, Gao, Tombouctou et Kidal qui n'ont pas été enquêtées.

Le tableau 6 montre que la couverture vaccinale des femmes enceintes contre le tétanos est encore faible au Mali : moins de la moitié des femmes (47 %) ont reçu les injections antitétaniques requises pour prévenir le tétanos néonatal. Par ailleurs, les nouveau-nés de mère résidant en milieu urbain (63 %) sont plus fréquemment protégés que ceux de mère résidant en milieu rural (43 %). Par rapport aux régions, on note des écarts non moins importants de couverture en VAT ; celle-ci dépasse 50 % seulement dans le district de Bamako (64 %). Les régions de Koulikoro (49 %), Kayes (47 %), Sikasso (46 %) et le district de Bamako (64 %) demeurent les mieux couverts en VAT. La proportion de nouveau-nés protégés contre le tétanos néonatal augmente avec le niveau d'instruction de la mère. Ces proportions passent de 44 % quand la mère est sans niveau d'instruction à 71 % quand elle a atteint au moins le niveau secondaire ou plus.

Comme on l'a déjà mentionné, pour toutes les naissances survenues au cours des cinq dernières années, on a demandé à la mère où elle avait accouché et qui l'avait assistée à ce moment-là. Les résultats de l'EDSM V révèlent que seulement une naissance sur deux (55 %) ont eu lieu dans un établissement de santé, contre 45 % en 2006 (Graphique 4). Le pourcentage de naissances survenues dans un établissement de santé ne varie pas beaucoup avec l'âge. Il se dégage un écart non négligeable entre le milieu urbain (91 %) et le milieu rural (46 %).

Les différences entre régions sont très importantes. Le pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé est inférieur à 50 % dans les régions de Kayes (47 %), Ségou (41 %) et Mopti (26 %) alors qu'il est de 63 % à Koulikoro et à Sikasso et 95 % à Bamako. Enfin, les proportions de naissances qui ont eu lieu dans un établissement de santé varient positivement et de façon significative avec le niveau d'instruction : de 50 % chez les femmes sans niveau d'instruction, le pourcentage passe à 77 % chez les femmes de niveau primaire et à 98 % chez les mères de niveau d'instruction secondaire ou plus.

En ce qui concerne l'assistance à l'accouchement, on observe que 59 % des femmes ont bénéficié de l'assistance d'un personnel de santé formé lors de l'accouchement ; proportion pratiquement au même niveau que celle pour le lieu de l'accouchement (55 %). La proportion de l'assistance à l'accouchement a augmenté depuis 2006 date à laquelle elle était estimée à 49 % (Graphique 4). L'assistance à

l'accouchement par du personnel de santé formé présente les mêmes variations selon les caractéristiques sociodémographiques que celles observées pour l'accouchement en formation sanitaire.

3.7 Vaccination des enfants

Dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination (PEV) mis en œuvre par le Ministère de la Santé Publique et conformément aux recommandations de l'OMS, un enfant est considéré comme complètement vacciné s'il a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, trois doses de DTCoq¹ contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, trois doses du vaccin contre la polio et le vaccin contre la rougeole. D'après le calendrier vaccinal, toutes ces vaccinations doivent avoir été administrées à l'enfant au cours de sa première année.

Lors de l'EDSM V, les informations sur la vaccination ont été recueillies de deux manières : soit elles étaient relevées à partir des carnets de vaccination (ce qui permet d'établir avec justesse la couverture vaccinale ainsi que le calendrier des vaccinations), soit enregistrées à partir des réponses données par la mère lorsque le carnet de l'enfant n'était pas disponible. Les résultats présentés ici ne concernent que les enfants de 12-23 mois, âges auxquels ils devraient avoir reçu tous les vaccins du PEV. Il apparaît au tableau 7 que pour 65 % des enfants de 12-23 mois, un carnet de vaccination a été montré à l'enquêtrice.

D'après les carnets de vaccination ou les déclarations des mères, 39 % d'enfants de 12-23 mois ont été complètement vaccinés et 12 % n'ont reçu aucun vaccin. Les autres (49 %) ont été partiellement vaccinés. De manière spécifique, 84 % des enfants ont reçu le BCG ; dans 80 % des cas, les enfants ont reçu la première dose de DTCoq ; et dans une proportion encore plus élevée (84 %) des cas, ils ont reçu la première dose de polio et 72 % des enfants de 12-23 mois ont été vaccinés contre la rougeole. La dose de Polio 0 (à la naissance) a été reçue par un peu plus de la moitié des enfants (64 %).

Pour le DTCoq et surtout la Polio, les déperditions sont importantes entre la première et la troisième dose. De 80 % pour la première dose de DTCoq, la couverture tombe à 74 % pour la deuxième et à 63 % pour la troisième, soit une déperdition de 21 %. En ce qui concerne la Polio, les pourcentages respectifs sont 84 %, 76 % et 50 %, soit une déperdition de près de 40 %.

La couverture vaccinale complète varie énormément d'une région à une autre. Selon la région, Koulikoro (43 %), Sikasso (42 %) et le district de Bamako (46 %) ont les taux de couverture complètement vaccinés les plus élevés. À l'opposé, la couverture complètement vaccinée est de 38 % dans les régions de Kayes et de Ségou, et 21 % à Mopti. C'est aussi dans la région de Mopti (29 %) que l'on trouve la proportion la plus élevée d'enfants de 12-23 mois n'ayant reçu aucun vaccin. L'instruction de la mère a aussi un effet positif sur la vaccination des enfants : le taux de couverture vaccinale complète passe de 36 % chez les enfants dont la mère est sans instruction à 57 % chez ceux dont la mère a au moins un niveau secondaire.

¹ Il faut noter que les enfants qui, d'après le carnet de vaccination ou les déclarations de la mère, avaient reçu des doses de Pentacoq ont été comptabilisés ici comme ayant reçu les doses correspondantes de DTCoq.

Tableau 7. Vaccination des enfants

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête par source d'information (selon le carnet de vaccination ou les déclarations de la mère), et pourcentage pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	BCG	DTCocq ¹				Polio			Rougeole	Tous les vaccins ³	Aucun vaccin	Pourcentage ayant présenté un carnet de vaccination	Effectif d'enfants
		1	2	3	0 ²	1	2	3					
Sexe													
Masculin	84,5	80,8	74,8	63,3	65,3	84,4	76,4	50,8	71,9	38,5	10,9	39,5	930
Féminin	82,7	79,8	74,1	62,8	63,4	82,9	75,2	49,2	71,5	39,3	12,8	36,5	916
Milieu de résidence													
Urbain	95,4	91,2	85,5	78,5	84,1	92,7	85,7	59,2	81,5	47,7	2,7	46,9	378
Rural	80,6	77,5	71,6	59,1	59,3	81,3	73,3	47,7	69,2	36,6	14,2	35,7	1 469
Région													
Kayes	83,5	80,2	73,7	62,0	65,7	86,6	79,2	50,3	65,8	37,9	9,9	39,9	218
Koulikoro	86,5	86,4	80,7	70,5	69,5	85,8	80,9	52,4	74,8	43,3	10,4	38,4	388
Sikasso	86,8	83,0	76,8	63,8	63,9	90,2	78,3	53,8	74,1	42,1	8,0	48,1	474
Ségou	82,4	77,9	71,4	60,9	59,8	78,8	73,3	47,7	75,9	37,7	13,6	27,6	337
Mopti	63,9	59,6	55,9	43,6	44,3	63,7	55,9	34,6	54,2	21,5	29,1	22,9	229
Bamako	95,0	89,7	83,7	74,1	84,9	91,8	83,4	57,8	79,6	45,7	3,5	45,9	200
Niveau d'instruction													
Aucun	81,6	77,8	71,7	59,8	60,9	81,6	73,4	47,2	69,1	35,7	13,7	34,5	1 494
Primaire	90,5	89,4	85,2	75,5	75,6	91,3	84,3	59,8	81,4	51,5	4,7	49,9	287
Secondaire ou +	98,1	96,9	90,8	82,8	94,5	96,7	93,6	71,4	89,0	57,0	1,9	65,3	65
Ensemble ⁴	83,6	80,3	74,4	63,1	64,4	83,6	75,8	50,0	71,7	38,9	11,9	38,0	1 846

¹ DTCocq ou Pentacoq.

² Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance

³ BCG, rougeole, les trois doses de DTCocq (ou Pentacoq) et les trois doses de polio (non compris la dose de polio donnée à la naissance).

⁴ Y compris 2 cas d'enfants de 12-23 mois, pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant.

3.8 Prévalence et traitement des maladies de l'enfance

Les Infections Respiratoires Aiguës (IRA), la fièvre et la déshydratation induite par des diarrhées sévères constituent les principales causes de décès d'enfants dans la plupart des pays en développement. Une attention médicale prompte et appropriée chaque fois qu'un enfant présente ces symptômes est cruciale et déterminante dans la réduction de la mortalité infantile. Pour obtenir les informations sur la prévalence et le traitement des maladies des enfants de moins de 5 ans, on a demandé aux mères si, dans les deux semaines ayant précédé l'enquête, l'enfant avait souffert de la toux avec une respiration courte et rapide (symptôme d'une infection respiratoire aiguë) et/ou de la fièvre et s'il avait eu de la diarrhée ; de plus, dans chaque cas, on a demandé ce qui avait été fait pour traiter l'enfant.

Dans l'ensemble, 1,6 % des enfants ont présenté des symptômes d'IRA (Graphique 5). Parmi les enfants qui ont eu une IRA au cours des deux semaines avant l'enquête, un traitement médical a été recherché auprès d'un professionnel de santé pour 30 % d'entre eux (Tableau 8). Cependant, les nombres de cas sont trop faibles pour permettre une analyse comparative selon les caractéristiques sociodémographiques.

Dans l'ensemble, 9 % des enfants ont eu de la fièvre au cours des deux semaines précédant l'enquête (Graphique 5). Parmi ces enfants, un traitement médical a été recherché auprès d'un professionnel de santé pour 31 % d'entre eux (Tableau 8). Les enfants du milieu rural (26 %), ceux de Mopti (23 %), et ceux dont la mère n'a aucun niveau d'instruction (27 %) sont ceux pour lesquels on a le moins fréquemment recherché des soins en cas de fièvre. Le sexe de l'enfant ne semble pas influencer de façon importante la décision de recherche d'un traitement (33 % pour les filles contre 29 % pour les garçons).

Tableau 8. Traitement des infections respiratoires aiguës, de la fièvre et de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu des symptômes d'Infections Respiratoires Aiguës (IRA) au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquels on a recherché un traitement dans un établissement de santé ou auprès d'un prestataire de santé; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquels on a recherché un traitement dans un établissement de santé ou auprès d'un prestataire de santé; parmi les enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquels on a recherché un traitement dans un établissement de santé ou auprès d'un prestataire de santé, pourcentage qui ont reçu une solution préparée à partir de sachets de Sels de Réhydratation Orale (SRO) et pourcentage qui ont été traité avec n'importe quel type de Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO), selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Enfants avec des symptômes d'IRA ¹		Enfants avec la fièvre		Enfants avec la diarrhée			
	Pourcentage pour lesquels un traitement a été recherché auprès d'un établissement/ prestataire de santé ²	Effectif avec IRA	Pourcentage pour lesquels un traitement a été recherché auprès d'un établissement/pr estataire de santé ²	Effectif avec la fièvre	Pourcentage pour lesquels un traitement a été recherché auprès d'un établissement/ prestataire de santé ²	Pourcentage à qui on a donné une solution à partir de sachets de Sels de Réhydratation Orale (SRO)	Pourcentage ayant été traité avec une TRO ³	Effectif avec la diarrhée
Groupe d'âges en mois								
<6	26,3	12	29,1	34	24,1	20,1	24,9	63
6-11	34,3	12	33,5	87	27,0	28,6	31,5	138
12-23	29,9	47	39,2	244	36,2	34,5	38,7	241
24-35	24,4	29	30,3	174	31,4	39,5	43,1	164
36-47	32,1	27	26,5	155	26,6	40,3	43,0	127
48-59	33,4	31	22,3	135	36,1	55,4	58,2	99
Sexe								
Masculin	33,1	87	32,9	444	29,1	34,9	38,7	448
Féminin	26,3	71	29,2	386	33,9	39,1	42,1	384
Milieu de résidence								
Urbain	45,4	20	53,9	154	41,3	40,3	43,7	171
Rural	27,8	138	26,0	676	28,8	35,9	39,4	661
Région								
Kayes	31,2	15	31,3	77	34,4	40,0	46,4	76
Koulikoro	19,4	25	26,7	105	30,6	46,0	47,2	181
Sikasso	36,4	49	33,1	312	37,1	38,7	43,3	226
Ségou	29,7	31	24,5	134	25,2	28,6	33,4	141
Mopti	15,7	25	23,2	120	21,3	21,7	24,1	89
Bamako	55,7	12	52,2	82	34,3	38,2	40,7	118
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	28,6	138	27,1	696	29,8	36,4	40,4	661
Primaire	38,0	19	48,3	111	37,8	39,3	41,1	141
Secondaire ou +	100,0	1	72,7	23	34,6	33,9	35,2	30
Ensemble ⁴	30,1	158	31,2	830	31,3	36,8	40,3	832

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.


¹ Les symptômes d'IRA (toux accompagnée d'une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou à des difficultés respiratoires associés à des problèmes de congestion dans la poitrine) sont considérés comme des indicateurs de la pneumonie.

² Non compris les pharmacies, les vendeurs ambulants, et les boutiques.

³ Comprend les sachets de Sel de Réhydratation Orale (SRO) et les solutions maison recommandées.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Graphique 5 Prévalence des maladies des enfants de moins de cinq ans et recherche de traitement (EDSM V 2012-2013*)



* Sans les 3 régions du Nord, Gao, Tombouctou et Kidal qui n'ont pas été enquêtées.

Par ailleurs, 9 % des enfants ont souffert de diarrhée au cours des deux dernières semaines avant l'enquête (Graphique 5). Un traitement médical a été recherché auprès d'un service de santé pour 31 % de ces enfants (Tableau 8). Par ailleurs, 37 % des enfants malades ont reçu une solution de Sel de Réhydratation Orale (SRO) et 40 % ont reçu une Thérapie de Réhydratation Orale (TRO, à savoir soit une SRO, soit une solution maison sucrée salée). Selon le milieu, la recherche de traitement auprès d'un établissement de santé et le recours à la TRO ne varient pas beaucoup : respectivement, 41 % en milieu urbain et 29 % en milieu rural pour la recherche de traitement ; 44 % en milieu urbain et 39 % en milieu rural pour le recours à la TRO.

3.9 Allaitement et alimentation de complément

Le lait maternel est la principale source de nutriments pour l'enfant. Pendant les six premiers mois, l'allaitement exclusif, c'est-à-dire sans aucun autre ajout, est recommandé par l'OMS parce qu'il transmet à l'enfant les anticorps de la mère et tous les éléments nutritifs nécessaires. En plus, le lait maternel, étant stérile, il permet d'éviter la diarrhée et d'autres maladies. Par ailleurs, il est recommandé qu'à partir de six mois, âge auquel l'allaitement maternel seul ne suffit plus pour garantir une croissance optimale à l'enfant, on introduise dans son alimentation des aliments solides de complément. Le tableau 9 présente les données sur la pratique de l'allaitement des enfants de 0 à 23 mois, l'introduction des aliments de complément et l'utilisation du biberon.

L'allaitement est une pratique quasi universelle au Mali et durant une période assez longue. En effet, les résultats de l'enquête montrent que 96 % des enfants de moins de six mois sont allaités et, de

plus, 89 % des enfants de 12-15 mois le sont encore. Cependant, la recommandation selon laquelle l'enfant doit être exclusivement allaité pendant les six premiers mois n'est pas bien suivie. En effet, dans le groupe d'âges 0-5 mois, seulement un enfant sur trois (33 %) n'a reçu que du lait maternel, c'est-à-dire qu'il a été exclusivement allaité au sein. Dans 67 % des cas, ces enfants ont déjà reçu autre chose en plus d'être allaités, essentiellement de l'eau seulement (28 %), aliments de complément (20 %), des jus et autres liquides non lactés (8 %) et autre lait (6 %). Par rapport aux recommandations internationales en matière d'alimentation des jeunes enfants, l'introduction d'autres liquides ou suppléments a donc lieu à un âge trop jeune. Les résultats montrent aussi que, à l'inverse, la recommandation relative à l'introduction d'aliments solides de complément à partir de l'âge de six mois n'est pas encore complètement suivie : en effet, seulement 49 % des enfants de 6 à 9 mois reçoivent, en plus du lait maternel, des aliments de complément. Par ailleurs, une proportion non négligeable d'enfants sont nourris avec un biberon (6 % des enfants de 0-5 mois).

Tableau 9. Allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaités et pourcentage de l'ensemble des enfants de moins de deux ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, Mali 2012-2013

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement												
Groupe d'âge en mois	Non allaités	Exclusivement allaités	Allaités et eau seulement	Allaités et jus/ liquides non-lactés		Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément	Total	Pourcentage actuellement allaité	Effectif de derniers-nés de moins de 2 ans	Pourcentage utilisant un biberon	Effectif d'enfants de moins de 2 ans
0-1	3,7	49,7	18,8	8,5	3,5	15,8	100,0	96,3	254	2,6	257	
2-3	5,7	31,0	27,0	8,3	7,1	20,9	100,0	94,3	378	7,3	381	
4-5	3,2	22,4	36,2	8,2	7,5	22,5	100,0	96,8	342	5,7	349	
6-8	4,3	11,4	22,7	10,5	6,0	45,1	100,0	95,7	623	8,5	630	
9-11	3,3	5,1	12,8	8,3	3,3	67,2	100,0	96,7	439	8,6	450	
12-17	12,5	2,6	2,9	3,9	2,9	75,2	100,0	87,5	882	4,9	909	
18-23	25,8	2,0	1,5	3,3	2,5	64,9	100,0	74,2	895	5,0	937	
0-3	4,9	38,5	23,7	8,4	5,6	18,8	100,0	95,1	632	5,4	639	
0-5	4,3	32,9	28,1	8,3	6,3	20,1	100,0	95,7	974	5,5	988	
6-9	4,2	10,3	20,8	10,5	5,6	48,7	100,0	95,8	784	8,3	795	
12-15	10,9	2,5	3,0	4,1	3,3	76,1	100,0	89,1	568	5,4	585	
12-23	19,2	2,3	2,2	3,6	2,7	70,0	100,0	80,8	1 777	5,0	1 846	
20-23	27,0	1,5	1,9	4,0	3,7	61,8	100,0	73,0	545	5,6	567	


Note: Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaités », « Allaités exclusivement », « Allaités et eau seulement », « Jus/liquides non lactés », « Autre lait », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autre laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

3.10 État nutritionnel des enfants

Les enfants mal nourris courent un risque élevé de morbidité et de mortalité ; en outre, la malnutrition affecte le développement mental de l'enfant. L'état nutritionnel des enfants est évalué sur la base de mesures anthropométriques. Les mesures du poids et de la taille ont été enregistrées pour les enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l'EDSM V. Ces données sur le poids et la taille permettent de calculer les trois indices suivants : la taille par rapport à l'âge (taille-pour-âge), le poids par rapport à la taille (poids-pour-taille) et le poids par rapport à l'âge (poids-pour-âge). Ces indices sont exprimés en terme de nombre d'unités d'écart-type par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006. Les enfants qui se situent à moins de deux écarts-types en dessous de la médiane de la population de référence, sont considérés comme mal nourris, tandis que ceux qui se situent à moins de trois écarts-types en dessous de la médiane sont considérés comme étant sévèrement mal

nourris. Le tableau 10 présente l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

Les enfants dont la taille-pour-âge se situe en dessous de moins de deux écarts-types de la médiane de la population de référence sont considérés comme accusant un retard de croissance. Un retard de croissance est le signe d'une malnutrition chronique ; il reflète une situation qui est généralement la conséquence d'une alimentation inadéquate et/ou de maladies survenues pendant une période relativement longue ou qui se manifestent à plusieurs reprises (paludisme par exemple).



Dans l'ensemble, 38 % des enfants souffrent de malnutrition chronique : 19 % sous la forme sévère (Graphique 6). Le niveau du retard de croissance augmente rapidement avec l'âge : de 15 % chez les enfants de moins de 6 mois, il passe à 24 % chez ceux de 9-11 mois, puis continue d'augmenter pour atteindre un maximum de 48 % à 18-23 mois, et se maintient à un niveau élevé après cet âge. Les enfants du milieu rural accusent plus fréquemment un retard de croissance que ceux du milieu urbain (42 % contre 23 %). La prévalence de la malnutrition chronique varie d'un minimum de 21 % à Bamako à un maximum de 47 % à Mopti. En effet, la prévalence de la malnutrition chronique touche plus d'enfants dans les régions de Mopti (47 %), de Ségou (41 %) et de Sikasso et Koulikoro (40 % chacune). Cependant, elle est également élevée à Kayes (34 %). Par ailleurs, les résultats montrent que le niveau de malnutrition chronique est nettement influencé par le niveau d'instruction de la mère : de 40 % chez les enfants de mère sans instruction, et de 31 % parmi ceux dont la mère a un niveau primaire, la proportion d'enfants atteints de malnutrition chronique passe à 18 % chez ceux dont la mère a un niveau d'instruction secondaire ou plus.

Tableau 10. État nutritionnel des enfants

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille en fonction de l'âge, le poids en fonction de la taille et le poids en fonction de l'âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-âge ¹			Poids-pour-taille				Poids-pour-âge				Effectif d'enfants
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET ²	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	
Groupe d'âges en mois												
<6	5,2	15,0	0,1	10,6	18,1	6,9	(0,5)	4,8	12,7	6,2	(0,4)	317
6-8	5,1	12,2	(0,3)	5,5	17,2	3,7	(0,7)	6,2	13,3	1,1	(0,8)	298
9-11	11,7	24,3	(1,0)	7,3	22,3	1,9	(1,0)	9,4	27,3	0,6	(1,3)	201
12-17	13,3	26,6	(1,0)	6,8	19,5	0,6	(0,9)	7,9	23,8	0,8	(1,2)	476
18-23	23,4	48,1	(1,9)	6,3	16,5	1,0	(0,8)	13,8	31,5	0,6	(1,5)	465
24-35	25,9	48,4	(1,8)	5,2	12,2	1,9	(0,5)	10,5	31,1	1,0	(1,4)	982
36-47	23,8	46,0	(1,8)	3,1	7,6	3,1	(0,3)	9,8	25,6	0,7	(1,3)	1 098
48-59	19,2	38,8	(1,6)	3,7	8,8	1,3	(0,5)	7,5	25,1	0,1	(1,3)	1 021
Sexe												
Masculin	19,9	39,8	(1,5)	4,9	12,8	2,2	(0,6)	8,8	26,7	1,0	(1,3)	2 491
Féminin	18,8	36,6	(1,4)	5,4	12,5	2,3	(0,5)	9,4	24,2	1,0	(1,2)	2 366
Milieu de résidence												
Urbain	9,8	23,2	(0,9)	4,2	11,2	2,1	(0,5)	3,7	16,8	1,7	(0,9)	941
Rural	21,6	41,9	(1,6)	5,4	13,0	2,3	(0,5)	10,4	27,5	0,9	(1,3)	3 917
Région												
Kayes	18,4	34,3	(1,3)	6,5	12,2	2,8	(0,5)	7,4	21,4	1,8	(1,1)	617
Koulikoro	20,1	39,5	(1,5)	4,3	11,1	2,0	(0,5)	6,9	24,4	1,0	(1,2)	1 078
Sikasso	18,6	39,9	(1,6)	4,5	13,4	1,0	(0,6)	10,0	27,3	0,8	(1,3)	1 158
Ségou	21,0	40,5	(1,5)	5,5	12,9	3,5	(0,5)	10,5	26,2	0,7	(1,2)	924
Mopti	26,0	46,5	(1,8)	6,6	14,7	2,9	(0,6)	14,6	32,1	0,8	(1,5)	623
Bamako	8,3	21,1	(0,8)	4,2	11,7	1,9	(0,6)	3,8	18,3	1,5	(0,9)	457
Niveau d'instruction de la mère³												
Aucun	20,7	40,2	(1,5)	5,3	13,5	1,9	(0,6)	9,8	26,7	1,0	(1,3)	3 782
Primaire	13,7	30,7	(1,2)	5,0	10,1	3,4	(0,5)	6,5	20,5	1,0	(1,1)	630
Secondaire ou +	8,3	18,2	(0,6)	3,2	8,1	5,3	(0,2)	0,8	11,0	2,3	(0,6)	147
Interview de la mère												
Mère interviewée	19,3	38,4	(1,5)	5,0	12,8	2,1	(0,6)	9,1	25,4	0,9	(1,2)	4 344
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	18,2	32,1	(1,3)	7,5	12,0	3,9	(0,4)	6,5	23,1	2,9	(1,0)	244
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage ⁴	21,0	41,5	(1,6)	4,5	10,3	2,8	(0,5)	10,7	28,7	0,6	(1,3)	269
Ensemble ⁵	19,3	38,3	(1,5)	5,1	12,7	2,3	(0,5)	9,1	25,5	1,0	(1,2)	4 857

Note: Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Chaque indice est exprimé en termes de nombre d'unités d'écart-type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006. Les indices présentés dans ce tableau ne sont PAS comparables à ceux basés sur les normes NCHS/CDC/OMS de 1977 utilisées précédemment. Le tableau est basé sur les enfants dont les dates de naissance (mois et année) et les mesures du poids et de la taille sont valables.

¹ Les enfants de moins de 2 ans et de moins de 85 cm sont mesurés en position allongée; les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

³ Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, les informations proviennent du Questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'a pas été listée dans le Questionnaire Ménage.

⁴ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁵ Y compris 30 cas d'enfants, pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant.

Les enfants dont le poids-pour-taille est en dessous de moins de deux écarts-types de la médiane de la population de référence sont atteints d'émaciation ou de maigreur. Cette forme de malnutrition aiguë est la conséquence d'une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l'observation et elle peut aussi être le résultat de maladies récentes, surtout la diarrhée. Les résultats montrent que 13 % des enfants sont émaciés dont environ le tiers (5 %) sous la forme sévère (Graphique 6). Les résultats indiquent que les enfants de 9-11 mois et ceux de 12-17 mois ont les niveaux d'émaciation les plus élevés (respectivement 22 % et 20 %). Le niveau de malnutrition aiguë varie selon la région de résidence : en effet, dans Mopti (15 %), Ségou (13 %) et Sikasso (13 %) les niveaux de la prévalence de la malnutrition aiguë sont les plus élevés alors qu'il est seulement de 12 % à Bamako et à Kayes.

Le surpoids et l'obésité concernent de plus en plus d'enfants dans les pays en développement, ce qui pourrait constituer dans l'avenir un nouveau problème de santé publique. Le pourcentage d'enfants dont le poids-pour-taille se situe au-dessus de deux écarts-types de la médiane de la population de référence sont en situation de surpoids ou sont atteints d'obésité. Alors que 13 % des enfants souffrent d'émaciation, à l'opposé, 2 % d'enfants sont trop gros. C'est dans les régions de Ségou (4 %), Mopti (3 %) et Kayes (3 %) que les proportions d'enfants présentant un surpoids ou sont obèses sont les plus élevées.

Les enfants dont le poids-pour-âge se situe en dessous de moins de deux écarts-types de la médiane de la population de référence présentent une insuffisance pondérale. Cet indice reflète les deux précédentes formes de malnutrition, chronique et aiguë. Au Mali, environ 26 % des enfants présentent une insuffisance pondérale dont un peu près de la moitié (9 %) sous sa forme sévère (Graphique 6). L'insuffisance pondérale est presque la même chez les garçons que chez les filles (24 % et 27 %), mais elle est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (28 % contre 17 %). Enfin, il faut signaler que c'est dans les régions de Mopti (32 %), Sikasso (27 %) et de Ségou (26 %) que les enfants sont également les plus touchés par l'insuffisance pondérale.

3.11 Tests de l'anémie et du paludisme

La lutte contre l'anémie et le paludisme occupe une place importante dans toutes les politiques et stratégies nationales de développement mises en place ces dernières années. Ainsi, dans l'étude Prospective Nationale du Mali 2025, la Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté et le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ont retenu la lutte contre l'anémie et le paludisme comme un des axes stratégiques prioritaires de lutte contre la pauvreté.

Le paludisme affaiblit le système immunitaire de l'enfant. Pour cela, l'enfant a besoin d'un niveau d'hémoglobine élevé pour résister contre la maladie ou résister à une aggravation éventuelle de la maladie. Un niveau d'hémoglobine inférieur à 8 g/dl dans le sang est considéré comme un indicateur indirect de l'infection palustre.

Un test d'hémoglobine et un test de paludisme ont été inclus à l'EDSM V afin d'estimer la prévalence de l'anémie et la prévalence de la parasitémie palustre pour le test de paludisme. Dans un ménage sur deux, le test d'hémoglobine a été effectué auprès de toutes les femmes de 15-49 ans qui ont accepté volontairement de s'y prêter. De même, tous les enfants de 6-59 mois de ces ménages, quelques gouttes de sang avaient été prélevées pour mesurer le niveau d'hémoglobine, mais également mesurer la prévalence de la parasitémie palustre, à condition que l'un des parents ou l'adulte responsable ait autorisé les tests.

La goutte de sang prélevée pour le test d'anémie a été testée en utilisant le système HemoCue (photomètre et microcuvette) et les résultats du test ont été immédiatement communiqués à ces personnes. Pour le test de paludisme, des gouttes épaisses de sang ont été confectionnées sur deux lames de microscopes dont la lecture pour déterminer le taux de parasites de paludisme dans le sang a été faite au laboratoire de parasitémie de l'Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP). Un test de diagnostic rapide (TDR) du paludisme a été également proposé pour tous les enfants ayant accepté de participer au test de paludisme. A tous les enfants dont le résultat au test de TDR est positif, un traitement a été proposé sur place dans le ménage.

3.11.1 Couverture des tests de l'anémie et du paludisme auprès des enfants

Comme mentionné précédemment, des gouttes de sang ont été prélevées auprès des enfants de 6-59 mois pour effectuer les tests d'anémie et de paludisme dans la moitié de l'échantillon des ménages sélectionnés de l'EDSM V. Tous les enfants de 6-59 mois dans le sous-échantillon des ménages sélectionnés pour l'enquête homme (un ménage sur deux) ont été sollicités pour donner quelques gouttes de sang pour les tests d'anémie et de paludisme. Les résultats préliminaires sont présentés ci-dessous.

Le tableau 11 fournit les taux de couverture des tests d'anémie et du paludisme chez les enfants (6-59 mois), selon certaines caractéristiques. Dans l'ensemble, plus de neuf enfants 6-59 mois sur dix (94 %) ont été testés pour l'anémie et dont les résultats ont été immédiatement fournis aux parents ou adultes responsables de l'enfant, et dans des proportions similaires (94 %), des gouttes de sang ont été prélevées pour le test de paludisme. Le taux de couverture est légèrement plus faible chez les enfants les plus jeunes que chez les plus âgés, passant de 86 % chez les enfants d'âges 6-8 mois à 95 % ou plus chez ceux d'âges 36 - 59 mois. Aussi bien pour le test d'anémie que pour le test de paludisme, les taux de couverture sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain (96 % contre 90 % pour la couverture du test d'anémie et 95 % contre 88 % pour la couverture du test de paludisme). Enfin, le taux de couverture des tests très élevé varie très peu selon la région, variant entre 95 % et 96 % pour l'anémie et 93 % et 96 % pour le paludisme. Cependant, le taux de couverture des tests à Bamako se révèle le plus faible (86 % pour le test d'anémie et 83 % pour le test de paludisme). Le refus de fournir du sang constitue la raison principale pour laquelle les enfants éligibles n'ont pas été testés.

Tableau 11. Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants de 6-59 mois

Pourcentage des enfants de 6-59 mois chez qui on a prélevé du sang pour effectuer les tests d'anémie et paludisme selon certaines caractéristiques socio-économiques et sanitaires, Mali, EDMS-V 2012-2013

Groupe d'âges	Pourcentage d'enfants de 6-59 mois chez qui on a prélevé du sang pour :		Effectif enfants de 6-59 mois
	Le test d'anémie	Gouttes épaisses/ parasitémie palustre	
Groupe d'âges en mois			
6-8	86,7	86,2	334
9-11	89,5	89,3	228
12-17	96,3	95,4	521
18-23	93,2	91,6	525
24-35	95,2	94,4	1 091
36-47	95,5	94,6	1 213
48-59	95,6	94,6	1 112
Sexe			
Masculin	94,1	93,2	2 588
Féminin	94,8	93,9	2 437
Milieu de résidence			
Urbain	89,6	88,0	981
Rural	95,6	94,9	4 044
Région			
Kayes	95,9	95,5	639
Koulikoro	94,5	93,7	1 098
Sikasso	94,7	93,4	1 223
Ségou	96,1	95,8	945
Mopti	96,3	96,1	635
Bamako	85,9	83,1	485
Ensemble	94,4	93,5	5 025

3.11.2 Prévalence de l'anémie chez les enfants et les femmes

Le tableau 12 présente les résultats sur la prévalence de l'anémie par niveau d'anémie pour les enfants et les femmes. Au niveau de l'ensemble des cinq régions du Mali, 82 % des enfants de 6-59 mois sont anémiés : 21 % souffrent d'anémie légère, 52 % souffrent d'anémie modérée, et 9 % d'anémie sévère. Les enfants des zones rurales (85 %) sont fréquemment atteints d'anémie que ceux des zones urbaines (68 %). En outre, la prévalence de l'anémie sévère est presque quatre fois plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (11 % et 3 %). C'est dans les régions de Mopti (15 %), Sikasso (10 %), Ségou et Koulikoro (9 %) que les prévalences de l'anémie sévère sont les plus élevées.

En général, les femmes sont moins touchées par l'anémie que les enfants. Au niveau de l'ensemble des cinq régions du Sud, 51 % des femmes souffrent d'anémie : 37 % souffrent d'anémie légère, 13 % d'anémie modérée et 1 % d'anémie sévère. Contrairement aux enfants, pour les femmes, on ne note pas d'écarts de prévalence de l'anémie sévère entre les zones urbaines et rurales (1 % en zones

urbaines et en zones rurales). Par région, la prévalence de l'anémie sévère chez les femmes est la plus élevée à Kayes (2 %) et à Koulikoro (2 %).

Tableau 12. Prévalence de l'anémie chez les enfants et les femmes

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois et de femmes de 15-49 ans considérés comme étant atteints d'anémies, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage atteint d'anémie	Pourcentage atteint d'anémie			Effectif
		Anémie légère	Anémie modérée	Anémie sévère	
ENFANTS					
Milieu de résidence					
Urbain	67,5	26,8	37,7	3,0	879
Rural	84,9	19,5	54,7	10,7	3 866
Région					
Kayes	79,3	22,4	50,2	6,7	613
Koulikoro	79,6	20,8	50,1	8,7	1 038
Sikasso	83,5	19,8	53,4	10,3	1 157
Ségou	84,8	22,5	52,9	9,4	909
Mopti	88,6	14,6	58,6	15,4	611
Bamako	68,0	26,9	38,7	2,4	417
Ensemble	81,7	20,8	51,5	9,3	4 745
FEMMES					
Milieu de résidence					
Urbain	44,2	34,7	8,4	1,0	1 231
Rural	53,7	37,4	14,8	1,4	3 941
Région					
Kayes	52,7	35,7	15,0	2,0	683
Koulikoro	47,1	33,7	11,8	1,6	1 093
Sikasso	52,0	35,8	15,0	1,1	1 205
Ségou	54,5	38,6	14,4	1,5	943
Mopti	56,9	42,2	13,7	1,1	625
Bamako	46,3	37,1	8,5	0,7	624
Ensemble	51,4	36,8	13,3	1,3	5 172

Note: Le tableau est basé sur les enfants et les femmes qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine, est ajustée en fonction du fait de fumer ou non (pour les femmes) en utilisant les formules du CDC (CDC, 1998). Les femmes et les enfants sont considérés comme atteints d'anémie sévère si le niveau d'hémoglobine est <7,0 g/dl et d'anémie modérée si cette valeur se situe entre 7,0 et 9,9 g/dl ; l'anémie est considérée comme légère chez les femmes non enceintes si le niveau d'hémoglobine se situe entre 10,0 et 11,9 g/dl ; chez les enfants et les femmes enceintes, l'anémie est considérée comme légère si le niveau d'hémoglobine se situe entre 10,0-10,9 g/dl.

3.11.3 Prévalence du paludisme chez les enfants

L'enquête EDMS V a estimé la prévalence du paludisme par la détermination du taux de parasites du paludisme dans le sang. Le taux est appelé encore prévalence de la parasitémie palustre. La technique consiste en la lecture microscopique des gouttes épaisses sur lames pour mesurer la parasitémie dans le sang afin d'assurer la comparabilité avec d'autres enquêtes nationales et internationales déjà réalisées. La lecture microscopique permet d'identifier aussi bien les parasites du paludisme à *Plasmodium falciparum* (asexué et sexué), que ceux du paludisme de *Plasmodium malariae*, de *Plasmodium*. ovale et de *Plasmodium*. vivax.


Le tableau 13 présente les taux de prévalence de la parasitémie palustre parmi les enfants de 6-59 mois selon certaines caractéristiques. Globalement, les résultats du test en laboratoire par la lecture des gouttes épaisses de sang montrent que la prévalence palustre parmi les enfants âgés de 6-59 mois est estimée à 52 %.

La prévalence de la parasitémie palustre augmente avec l'âge des enfants. Ainsi, le paludisme touche moins de 50 % parmi les jeunes enfants d'âges 6-23 mois, mais par contre elle concerne plus de la moitié des enfants âgés de deux ans ou plus, c'est-à-dire ceux de 24-59 mois. En effet, la prévalence du paludisme varie entre 38 % et 49 % parmi les enfants de moins de deux ans (6-23 mois).

Tableau 13 : Prévalence du paludisme (test de goutte épaisse)

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le résultat du test de parasitémie palustre à la lecture des gouttes épaisses au laboratoire est positif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques et sanitaires , Mali, EDSM-V 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Résultat du test positif (gouttes épaisses)	Effectif d'enfants
Groupe d'âges en mois		
6-8	38,3	288
9-11	45,8	204
12-17	44,4	497
18-23	49,2	481
24-35	50,9	1 030
36-47	55,0	1 147
48-59	58,0	1 052
Sexe		
Masculin	52,6	2 412
Féminin	50,5	2 287
Milieu de résidence		
Bamako	9,9	403
Autres villes	22,9	460
Ensemble urbain	16,8	863
Rural	59,5	3 836
Région		
Kayes	36,9	611
Koulikoro	50,2	1 028
Sikasso	62,1	1 141
Segou	55,7	906
Mopti	70,6	610
Bamako	9,9	403
Ensemble	51,6	4 699



Chez les enfants âgés de deux ans et plus, la prévalence varie de 51 % pour les âges 24-35 mois à 58 % pour les âges 48-59 mois. Selon la région, la prévalence du paludisme est la plus élevée à Mopti (71 %), Sikasso (62 %), à Ségou (56 %) et à Koulikoro (50 %). Inversement, la prévalence du paludisme est la plus faible à Bamako (10 %). Dans la région de Kayes, la prévalence se révèle pourtant un peu élevée aussi (37 %) (Graphique 7).

Comparé aux résultats de l'enquête nationale sur l'anémie et la parasitémie palustre de 2010 (EA&P, 2010), on constate que la prévalence du paludisme est passée de 38 % en 2010 à 52 % en 2012-2013 (Graphique 7).

3.12 Indicateurs du paludisme

L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide, le traitement de la fièvre chez les enfants par des antipaludéens, et la prise préventive d'antipaludéens par la femme enceinte constituent les moyens les plus efficaces de lutte contre le paludisme.

Les données obtenues à l'EDSM V permettent d'évaluer les proportions de ménages disposant de moustiquaires, en particulier les Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide (MII) et leur utilisation par les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

Il ressort du tableau 14, qu'au Mali, près de neuf ménages sur dix possèdent, au moins, une moustiquaire, qu'elle ait été traitée ou non (88 %). Cette proportion est plus élevée en milieu rural (89 %) qu'en milieu urbain (86 %). En ce qui concerne les MII, la situation précédente semble la même : 85 % des ménages du milieu rural en possède au moins une, contre 82 % en milieu urbain. Dans l'ensemble, 84 % des ménages possèdent au moins une moustiquaire de ce type.

La proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant passé la nuit précédant l'enquête sous une moustiquaire, quelle qu'elle soit, est de 74 % : elle est pratiquement la même en milieu urbain qu'en milieu rural (73 % et 74 %). Étant donné que la possession de MII est un peu généralisée, la proportion d'enfants ayant dormi sous une MII est presque la même (70 %) que celle qui ont dormi sous une moustiquaire quelle qu'elle soit, qui est de 74 % . Comme pour la moustiquaire de tout type, la proportion d'enfants ayant dormi sous une MII est également la même milieu urbain (69 %) qu'en milieu rural (70 %). Par ailleurs, si on se limite aux seuls enfants qui vivent dans un ménage possédant au moins une MII, on constate une proportion encore plus élevée d'utilisation de MII par les enfants (79 %). Ce taux d'utilisation des MII est la même en milieu urbain qu'en milieu rural (79 %).

Quant aux femmes enceintes ayant passé la nuit précédant l'enquête sous une moustiquaire, imprégnée ou non, c'est en milieu rural que le taux est plus élevé (79 % contre 75 % en milieu urbain). Dans l'ensemble, près de huit femmes sur dix ont dormi sous une moustiquaire (78 %). La proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une MII est de 75 % (71 % en milieu urbain et 76 % en milieu rural).

Par ailleurs le taux d'utilisation des MII par les femmes enceintes dans les ménages qui possèdent ce type de moustiquaires, c'est-à-dire la proportion de femmes enceintes vivant dans un ménage ayant une MII et ayant dormi sous ce type de moustiquaire, est de 86 %. Cette proportion est plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement 86 % et 85 %).

Concernant la pulvérisation intradomiciliaire à l'aide d'insecticide, elle est encore très faible et non généralisée au Mali. En effet, seulement 6 % des ménages ont eu les murs intérieurs du logement pulvérisés avec un insecticide résiduel au cours des douze mois qui ont précédé l'enquête. Ce pourcentage est de 5 % en milieu urbain et de 7 % en milieu rural. Pour ce qui concerne les enfants âgés de moins de cinq ans qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ou ont dormi dans un ménage dont l'intérieur du logement a été pulvérisé d'insecticide résiduel au cours des 12 derniers, le pourcentage est de 72 %, légèrement un peu plus élevé que le pourcentage des enfants qui ont simplement dormi sous une MII la nuit dernière (70 %). Pour les femmes enceintes, le pourcentage de celles qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ou ont dormi dans un ménage dont l'intérieur du logement a été pulvérisé d'insecticide résiduel au cours des 12 derniers, est de 77 %. Ce pourcentage est de 72 % parmi celles du milieu urbain contre 78 % parmi celles du milieu rural. Comme pour les enfants, ce pourcentage est simplement de 2 % plus élevé que celui qui ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête.

Tableau 14. Indicateurs du paludisme

Possession et utilisation de moustiquaires, traitement préventif du paludisme au cours de la grossesse et traitement des enfants ayant de la fièvre avec des antipaludéens, selon le milieu de résidence, Mali 2012-2013

Indicateur du paludisme	Milieu de résidence					
	Urbain		Rural		Ensemble	
	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage	Effectif
Moustiquaires						
Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire (imprégnée ou non)	85,9	2 161	88,7	7 944	88,1	10 105
Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ¹	81,9	2 161	85,1	7 944	84,4	10 105
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non) la nuit ayant précédé l'enquête	73,1	2 012	73,8	8 610	73,7	10 622
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête	68,8	2 012	70,2	8 610	69,9	10 622
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant une MII qui ont dormi sous une MII, la nuit ayant précédé l'enquête ¹	79,2	1 747	79,0	7 648	79,1	9 395
Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une moustiquaire (imprégnée ou non) la nuit ayant précédé l'enquête	75,3	185	78,9	1 015	78,4	1 200
Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ¹	71,4	185	75,9	1 015	75,2	1 200
Pourcentage de femmes enceintes de 15-49 ans dans les ménages ayant une MII qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ¹	84,6	156	86,4	892	86,1	1 049
Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID)						
Pourcentage de ménages dont l'intérieur du logement a été pulvérisé avec un insecticide résiduel au cours des 12 derniers mois	4,9	2 161	6,6	7 944	6,2	10 105
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ou dans un ménage dont l'intérieur du logement a été pulvérisé d'insecticide résiduel au cours des 12 derniers mois ¹	70,1	2 012	72,0	8 610	71,6	10 622
Pourcentage de femmes enceintes qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête ou dans un ménage dont l'intérieur du logement a été pulvérisé d'insecticide résiduel au cours des 12 derniers mois ¹	72,4	185	77,6	1 015	76,8	1 200
Traitement préventif du paludisme au cours de la grossesse						
Pourcentage des dernière naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête pour lesquelles la mère a pris des antipaludéens à titre préventif au cours de la grossesse	85,8	807	60,8	3 157	65,9	3 965
Pourcentage des dernière naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête pour lesquelles la mère a reçu un Traitement Préventif Intermittent (TPI) au cours d'une visite prénatale ²	37,0	807	15,5	3 157	19,9	3 965
Traitement de la fièvre						
Pourcentage d'enfants avec de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête	8,2	1 898	8,7	7 756	8,6	9 655
Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête pourcentage de ceux qui ont pris :						
Une antipaludéen quelconque	26,0	155	21,9	674	22,7	830
SP/Fansidar	5,4	155	6,3	674	6,1	830
Chloroquine	3,9	155	4,9	674	4,7	830
Amodiaquine	11,9	155	8,3	674	9,0	830
Quinine	2,4	155	2,4	674	2,4	830
Combinaison avec artémisinine	5,3	155	4,2	674	4,4	830
Autre antipaludéen	0,0	155	0,0	674	0,0	830
Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont pris le même jour/jour suivant l'apparition de la fièvre :						
Une antipaludéen quelconque	20,7	155	14,2	674	15,4	830
SP/Fansidar	3,7	155	3,8	674	3,8	830
Chloroquine	2,8	155	3,6	674	3,5	830
Amodiaquine	10,7	155	5,1	674	6,1	830
Quinine	2,1	155	1,4	674	1,6	830
Combinaison avec artémisinine	3,9	155	2,3	674	2,6	830
Autre antipaludéen	0,5	155	0,6	674	0,6	830

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est soit une moustiquaire pré-imprégnée permanente qui ne demande aucun traitement, soit une moustiquaire pré-imprégnée mais obtenue il y a moins de 12 mois, soit une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois. ² Le Traitement Préventif Intermittent consiste à administrer, de manière préventive, deux doses de SP/Fansidar au cours des visites prénatales.

Pour réduire le paludisme pendant la grossesse, il est recommandé que les femmes enceintes non seulement dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide mais aussi prennent, à titre préventif, des antipaludéens pendant la grossesse. Au cours de l'EDSM V, on a donc demandé à toutes les femmes qui avaient eu une naissance pendant les cinq dernières années si, durant la grossesse la plus récente, elles avaient pris des antipaludiques et, dans le cas d'une réponse positive, de quels antipaludéens il s'agissait.

Pour seulement 66 % des dernières naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête, la mère a pris, à titre préventif, des antipaludéens au cours de la grossesse : 86 % en milieu urbain et 61 % en milieu rural, tendance contraire à celle de l'utilisation de moustiquaires, ou de logements pulvérisés avec de l'insecticide résiduel. Par contre, la proportion de femmes ayant suivi, comme recommandé, un Traitement Préventif Intermittent (TPI), à savoir deux doses de SP/Fansidar au cours des visites prénatales n'est que de 20 % et les femmes enceintes du milieu urbain apparaissent en avoir eu accès beaucoup plus que celles du milieu rural (37 % contre 16 %) ; soit un peu plus de deux fois le pourcentage du milieu rural.

Pendant la collecte des données, on a également demandé aux mères si leurs enfants avaient eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête et, dans ce cas, quels antipaludéens avaient été pris par cet enfant. Parmi les enfants de moins de cinq ans, 9 % avait eu de la fièvre dans les deux semaines précédentes. Cette proportion semble la même en milieu urbain (8 %) qu'en milieu rural (9 %). Parmi ces enfants, 23 % ont pris des antipaludéens, dont la majorité ont pris de l'Amodiaquine (9 %), des SP/Fansidar (6 %), de la Chloroquine (5 %), une combinaison avec Artémisinine (4 %) et le sel de quinine (2 %). La prise de l'Amodiaquine, l'antipaludéen le plus utilisé, est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (12 % contre 8 %). La prise d'une combinaison avec Artémisinine est pratiquement la même en milieu urbain qu'en milieu rural (5 % et 4 %). Par ailleurs, on constate que seulement 15 % des enfants avec la fièvre ont pris un antipaludéen quelconque le jour même ou le jour suivant l'apparition de la fièvre.

3.13 Mortalité des enfants

Les niveaux de mortalité infantile et juvénile comptent parmi les indicateurs les plus appropriés pour évaluer la situation socio-économique d'un pays. L'estimation de la mortalité infantile et juvénile constitue l'un des principaux objectifs de l'EDSM V. Le calcul des indices se base sur les informations recueillies directement à partir de l'historique des naissances. Cinq indicateurs ont été calculés :

- 1) le quotient de mortalité infantile qui mesure la probabilité pour un enfant né vivant de décéder avant son premier anniversaire ;
- 2) le quotient de mortalité juvénile qui mesure la probabilité pour un enfant survivant à son premier anniversaire de décéder avant d'atteindre le quatrième anniversaire ;
- 3) le quotient de mortalité infanto-juvénile qui mesure globalement la probabilité pour un enfant né vivant de mourir avant son quatrième anniversaire ; les composantes de la mortalité infantile que sont ;
- 4) le quotient de mortalité néonatale, ou probabilité de mourir au cours du premier mois suivant la naissance ; et
- 5) le quotient de mortalité post-néonatale, ou probabilité de mourir dans la tranche d'âge 1-11 mois.


Chacun de ces quotients est exprimé pour 1 000 naissances vivantes (sauf pour la mortalité juvénile qui est exprimé pour 1 000 enfants survivants à douze mois) et a été calculé pour différentes périodes quinquennales ayant précédé l'enquête.

Le tableau 15 présente les différents quotients pour trois périodes quinquennales précédant 2012 et pour l'ensemble des cinq régions Sud du Mali et le district de Bamako ayant été couverts par l'EDSM V. Pour la période des six dernières années avant l'EDSM V, c'est-à-dire la période séparant

la précédente enquête (EDSM IV, 2006) et celle de 2012-2013, le risque de mortalité infantile est évalué à 58 %.

Quotients de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, Mali 2012-2013					
Nombre d'années ayant précédé l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité post-néonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (1q0)	Mortalité juvénile (4q1)	Mortalité infanto-juvénile (5q0)
0-5	35	23	58	42	98
5-9	38	33	70	47	114
10-14	46	32	78	56	129

¹ Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale



Ce niveau se décompose de la manière suivante : 35 % pour la mortalité néonatale et 23 % pour la mortalité post-néonatale. Le quotient de mortalité juvénile est estimé à 42 %. Globalement, le risque de mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire le risque de décès avant l'âge de 5 ans est de 98 % pour l'ensemble des cinq régions du Sud, à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. En d'autres termes, environ un enfant sur dix meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans.

Le graphique 8 présente l'évolution des quotients de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile d'après les résultats de l'EDM IV en 2006, du RGPH en 2009 et de l'EDSM V en 2012-2013. Ces résultats mettent en évidence une tendance générale à la baisse des risques de décès des enfants avant l'âge de 5 ans.

3.14 Connaissance du VIH/sida

Au cours de l'EDSM V, on a posé aux femmes et aux hommes une série de questions sur la connaissance du VIH/sida, sur ses modes de transmission et de prévention ainsi que sur les comportements sexuels.

A la lecture du tableau 16, on constate que, dans l'ensemble, pratiquement la majorité des femmes (83 %) et presque tous les hommes (96 %) ont déclaré avoir entendu parler du VIH/sida et ces proportions ne varient que très peu selon les différentes caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristique sociodémographique	Femme		Homme	
	A entendu parler du sida	Effectif de femmes	A entendu parler du sida	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-24	83,9	3 736	93,5	1 278
15-19	82,1	1 891	91,7	792
20-24	85,7	1 845	96,4	486
25-29	82,5	2 078	97,6	524
30-39	82,5	3 004	98,1	1 104
40-49	79,2	1 606	97,8	889
État matrimonial				
Célibataire	86,6	1 417	93,8	1 391
A déjà eu des rapports sexuels	92,4	513	98,4	530
N'a jamais eu de rapports sexuels	83,3	904	90,9	861
En union	81,8	8 820	98,0	2 375
En rupture d'union	81,5	187	93,9	30
Milieu de résidence				
Urbain	95,8	2 583	98,8	977
Rural	78,1	7 841	95,6	2 819
Région				
Kayes	75,0	1 333	96,0	459
Koulikoro	81,9	2 196	95,9	716
Sikasso	86,7	2 359	96,9	888
Ségou	83,1	1 900	95,9	763
Mopti	66,1	1 241	94,7	424
Bamako	97,3	1 394	98,7	545
Niveau d'instruction				
Aucun	78,7	7 903	95,7	2 302
Primaire	92,5	1 863	96,8	986
Secondaire ou +	99,5	657	99,0	508
Ensemble 15-49 ¹	82,5	10 424	96,4	3 796
50-59	na	na	96,9	603
Ensemble 15-59	na	na	96,5	4 399

na: Non applicable

Toutefois, une proportion pas très élevée des femmes et des hommes savent, à la fois, que l'utilisation d'un condom à chaque rapport sexuel et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté permettent d'éviter de contracter le virus (48 % des femmes et 66 % des hommes) (Tableau 17). Les hommes sont donc légèrement mieux informés que les femmes sur certains moyens d'éviter l'infection. Cependant, il faut noter que ces niveaux de connaissance ont diminué chez les femmes depuis l'EDS IV de 2006, passant de 53 % à 48 % et ils semblent un peu augmenté chez les hommes (63 % à 66 %).

Le tableau 17 montre par ailleurs que, chez les femmes comme chez les hommes, la connaissance des moyens d'éviter le virus est étroitement liée au niveau d'instruction. Cependant, que ce soit chez les femmes et chez les hommes ayant le niveau d'instruction le plus élevé (secondaire ou plus), on constate que le niveau de connaissance des deux moyens de prévention est loin d'être généralisé (76 % aussi bien chez les femmes que chez les hommes).

On constate aussi que les femmes et les hommes du milieu urbain connaissent un peu plus fréquemment ces deux méthodes de prévention que ceux du rural (respectivement 64 % contre 43 % et 71 % contre 64 %). Au niveau régional, ce sont les femmes de Bamako (66 %), de Ségou, Sikasso et Koulikoro (48 % pour chacune de ces régions) qui sont les mieux informées, alors qu'à Mopti (33 % chacun) et à Kayes (44 %), elles le sont beaucoup moins. Par contre, plus de 50 % des hommes sont mieux informés dans toutes les régions et dans le district de Bamako. Les régions dans lesquelles, les hommes semblent les plus informés, sont un peu contraire à celles chez les femmes, c'est-à-dire que contrairement aux femmes, les hommes sont les mieux informés à Bamako et à Ségou (72 %) suivit par Kayes (68 %).

Tableau 17. Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, ont déclaré que l'on pouvait réduire les risques de contracter le virus du sida en utilisant des condoms à chaque rapport sexuel, et en se limitant à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a pas d'autres partenaires, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant déclaré que le risque de contracter de VIH pouvait être réduit en :				Pourcentage d'hommes ayant déclaré que le risque de contracter de VIH pouvait être réduit en :			
	Utilisant des condoms ¹	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté ²	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté ^{1,2}	Effectif de femmes	Utilisant des condoms ¹	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté ²	Utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire non infecté ^{1,2}	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	55,8	63,5	49,2	3 736	68,4	70,4	60,1	1 278
15-19	53,1	61,2	46,7	1 891	64,9	66,5	55,7	792
20-24	58,6	65,9	51,7	1 845	73,9	76,9	67,1	486
25-29	55,3	64,6	49,2	2 078	74,7	78,5	67,0	524
30-39	54,6	63,2	48,2	3 004	75,5	82,5	70,8	1 104
40-49	48,8	59,2	43,1	1 606	73,3	80,2	68,8	889
État matrimonial								
Célibataire	59,0	66,0	51,9	1 417	70,5	72,2	62,3	1 391
A déjà eu des rapports sexuels	66,3	73,1	58,5	513	84,8	84,1	75,3	530
N'a jamais eu de rapports sexuels	54,8	62,0	48,1	904	61,7	64,8	54,4	861
En union	53,3	62,5	47,2	8 820	73,6	80,3	68,5	2 375
En rupture d'union	65,9	63,3	55,3	187	73,6	82,0	64,1	30
Milieu de résidence								
Urbain	71,7	77,1	64,1	2 583	78,8	82,1	71,3	977
Rural	48,5	58,3	42,7	7 841	70,3	75,7	64,4	2 819
Région								
Kayes	48,6	57,5	43,5	1 333	72,1	79,1	67,5	459
Koulikoro	54,8	64,7	47,5	2 196	67,2	76,9	62,1	716
Sikasso	54,7	63,4	47,5	2 359	72,0	75,4	63,9	888
Ségou	52,9	63,3	48,2	1 900	77,3	80,2	71,5	763
Mopti	38,2	45,7	33,2	1 241	65,7	70,7	59,6	424
Bamako	74,2	79,7	66,5	1 394	79,0	81,1	71,8	545
Niveau d'instruction								
Aucun	48,8	58,2	42,7	7 903	67,5	74,5	61,9	2 302
Primaire	67,4	74,5	60,5	1 863	78,5	79,5	71,0	986
Secondaire ou +	83,3	87,2	76,1	657	83,1	86,3	76,4	508
Ensemble 15-49 ³	54,3	63,0	48,0	10 424	72,5	77,4	66,2	3 796
50-59	na	na	na	na	66,8	78,9	63,5	603
Ensemble 15-59	na	na	na	na	71,7	77,6	65,8	4 399

na = Non applicable

¹ En utilisant un condom à chaque rapport sexuel

² Partenaire sexuel qui n'a pas d'autres partenaires sexuels

³ Y compris 12 cas de femmes 15-49 ans et 16 cas d'hommes 15-49 ans, pour lesquels le niveau d'instruction est manquant.

3.15 Multiplicité des partenaires sexuels et utilisation du condom

Le multipartenariat dans les rapports sexuels accroît le risque de contracter le VIH. Ce risque est d'autant plus important que l'utilisation du condom comme moyen de prévention est faible. Au regard du tableau 18.1, on constate que moins de 1 % (0,8 %) des femmes de 15-49 ans ont déclaré avoir eu au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois. Comparativement aux femmes en union (0,6 %), les femmes célibataires (1,9 %) présentent des proportions d'avoir des partenaires sexuels multiples au cours des 12 derniers mois plus élevées. Par contre, chez les femmes en rupture d'union, on n'observe pratiquement pas de fréquence de cette pratique, certainement dû à la faiblesse des effectifs.

Tableau 18.1 Partenaires sexuels multiples au cours des 12 derniers mois: Femmes

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois; parmi les femmes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré l'utilisation d'un condom lors des derniers rapports sexuels; et nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie pour les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Parmi toutes les femmes :		Parmi les femmes ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois :		Parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹ :	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré l'utilisation d'un condom au cours des derniers rapports sexuels	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
Groupe d'âges						
15-24	0,9	3 736	7,9	32	2,2	2 791
15-19	0,9	1 891	7,3	18	2,2	1 106
20-24	0,8	1 845	8,6	15	2,2	1 685
25-29	1,0	2 078	16,7	21	2,4	2 002
30-39	0,7	3 004	1,9	22	2,4	2 921
40-49	0,4	1 606	24,5	7	2,4	1 553
État matrimonial						
Célibataire	1,9	1 417	17,9	27	2,2	500
En union	0,6	8 820	6,1	56	2,3	8 590
En rupture d'union	0,0	187	-	0	4,3	177
Milieu de résidence						
Urbain	1,1	2 583	18,9	28	2,4	2 141
Rural	0,7	7 841	5,3	55	2,3	7 127
Région						
Kayes	0,5	1 333	0,0	7	1,4	1 220
Koulikoro	0,6	2 196	0,0	12	1,9	1 971
Sikasso	0,8	2 359	15,1	20	3,5	2 125
Ségou	0,8	1 900	19,6	14	1,8	1 725
Mopti	0,9	1 241	0,0	11	1,8	1 107
Bamako	1,3	1 394	13,4	18	3,2	1 120
Niveau d'instruction						
Aucun	0,6	7 903	7,2	51	2,3	7 329
Primaire	1,0	1 863	0,0	18	2,5	1 442
Secondaire ou +	2,1	657	32,8	14	2,7	497
Ensemble ²	0,8	10 424	9,9	83	2,3	9 268

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les femmes qui n'ont pas fourni une réponse numérique ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Ce comportement est aussi pratiquement le même en milieu urbain qu'en milieu rural (1,1 % contre 0,7 %) et autant le même à mesure que le niveau d'instruction augmente (0,6 % chez les femmes sans instruction, 1,0 % chez celles ayant atteint le niveau primaire et à 2,1 % parmi celles ayant un niveau secondaire ou plus). Autrement dit, plus les femmes sont instruites, elles ont légèrement tendance à avoir plus d'un partenaire sexuel. Au niveau régional, ce comportement varie d'un minimum d'environ 0,5 % à Kayes à un maximum de 1,3 % à Bamako.

Parmi les femmes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, 9,9 % ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours de leurs derniers rapports sexuels. Selon les caractéristiques sociodémographiques, le nombre de cas est légèrement faible pour être analysé ; mais l'utilisation d'un condom semble toutefois élevée au niveau de l'ensemble (10 %).

Les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels ont déclaré avoir eu, en moyenne, 2,3 partenaires sexuels au cours de leur vie. Le nombre de partenaires sexuels sur la durée de vie varie peu selon les caractéristiques sociodémographiques, mais toutefois, les femmes en rupture d'union (4 partenaires), les femmes des régions de Sikasso (4 partenaires), celles de Bamako (3 partenaires) et celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (3 partenaires) ont déclaré avoir eu le plus grand nombre de partenaires sexuels.

Le tableau 18.2 présente les mêmes résultats pour les hommes. On constate que 11,4 % d'hommes de 15-49 ans ont déclaré avoir eu au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois. Comparativement aux hommes célibataires (4,5 %), les hommes en rupture d'union (4,8 %), les hommes en union (15,6 %) ont eu plus fréquemment des partenaires multiples au cours des 12 derniers mois. Ce phénomène pourrait être en parti lié à la polygamie. Contrairement aux femmes, ce comportement est d'autant moins fréquent que le niveau d'instruction augmente, passant de 12,8 % chez les hommes sans instruction à 9,5 % chez ceux ayant atteint le niveau secondaire ou plus. Au niveau régional, ce comportement varie d'un minimum de 9,2 % à Bamako et à Ségou à un maximum de 14 % à Koulikoro et à Mopti.

Parmi les hommes de 15-49 ans ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, 10,1 % ont déclaré avoir utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports sexuels. Encore une fois et comme chez les femmes, l'utilisation du condom portés sur un nombre de cas assez faible pour être analysé selon les caractéristiques sociodémographiques. Toutefois, le pourcentage d'utilisation d'un condom au niveau de l'ensemble des hommes 15-49 ans est un peu élevé (10 %), et comme constaté précédemment chez les femmes.

Les hommes de 15-49 ans ayant déjà eu des rapports sexuels ont déclaré avoir eu, en moyenne, 3,5 partenaires sexuelles au cours de leur vie. Les hommes ayant déclaré avoir eu le plus de partenaires sexuelles sont les hommes 30-49 ans (4 partenaires), les hommes en union (4 partenaires), ceux en rupture d'union (4 partenaires), ceux du milieu urbain (5 partenaires), ceux de Bamako et de Koulikoro (4 partenaires) et les plus instruits, c'est-à-dire de niveau d'instruction secondaire ou plus (5 partenaires) et de niveau primaire (4 partenaires).

Tableau 18.2 Partenaires sexuelles multiples au cours des 12 derniers mois: Hommes

Parmi tous les hommes de 15-59 ans, pourcentage qui ont eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire au cours des 12 derniers mois; parmi les hommes ayant eu plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré l'utilisation d'un condom lors des derniers rapports sexuels; Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie pour les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mali 2012-2013

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les hommes :		Parmi les hommes ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois :		Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels ¹ :	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré l'utilisation d'un condom au cours des derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie	Effectif d'hommes
Groupe d'âges						
15-24	4,9	1 278	38,0	62	3,0	436
15-19	2,3	792	31,1	18	2,4	137
20-24	9,1	486	40,8	44	3,3	299
25-29	7,7	524	24,4	40	2,9	433
30-39	13,8	1 104	6,4	152	4,0	949
40-49	20,1	889	0,4	178	3,6	765
État matrimonial						
Célibataire	4,5	1 391	49,8	62	3,2	483
En union	15,6	2 375	3,2	370	3,6	2 073
En rupture d'union	4,8	30	65,1	1	4,1	27
Milieu de résidence						
Urbain	8,5	977	24,1	83	4,6	629
Rural	12,4	2 819	6,8	350	3,2	1 955
Région						
Kayes	11,8	459	12,1	54	3,3	320
Koulikoro	14,4	716	9,7	103	3,8	530
Sikasso	10,7	888	11,0	95	3,4	553
Ségou	9,2	763	0,0	70	3,1	536
Mopti	14,2	424	6,5	60	3,3	290
Bamako	9,2	545	25,7	50	4,2	354
Niveau d'instruction						
Aucun	12,8	2 302	2,9	295	3,1	1 718
Primaire	9,2	986	18,6	90	4,2	525
Secondaire ou +	9,5	508	38,5	48	4,6	341
Ensemble 15-49 ²	11,4	3 796	10,1	433	3,5	2 584
50-59	20,4	603	0,9	123	3,8	493
Ensemble 15-59	12,7	4 399	8,1	557	3,6	3 077

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les hommes qui n'ont pas fourni une réponse numérique ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.